

Pyrazole derivatives, process for their preparation and pharmaceutical compositions containing them.

Publication number: EP0576357

Publication date: 1993-12-29

Inventor: BARTH FRANCIS ST JAMES-AP B (FR); CASELLAS PIERRE (FR); CONGY CHRISTIAN (FR); MARTINEZ SERGE (FR); CARMONA MURIELLE (FR)

Applicant: SANOFI ELF (FR)

Classification:

- International:

A61K31/415; A61K31/4155; A61K31/4402; A61K31/4427; A61K31/443; A61K31/445; A61K31/5375; A61K31/553; A61P1/08; A61P9/10; A61P11/08; A61P21/00; A61P25/00; A61P25/04; A61P25/06; A61P25/08; A61P25/18; A61P25/28; A61P27/02; A61P27/06; A61P37/06; A61P43/00; C07D231/12; C07D231/14; C07D231/38; C07D231/40; C07D401/12; C07D403/12; C07D405/12; C07D453/02; C07D493/08; A61K31/415; A61K31/4155; A61K31/4402; A61K31/4427; A61K31/443; A61K31/5375; A61K31/553; A61P1/00; A61P9/00; A61P11/00; A61P21/00; A61P25/00; A61P27/00; A61P37/00; A61P43/00; C07D231/00; C07D401/00; C07D403/00; C07D405/00; C07D453/00; C07D493/00; (IPC1-7): C07D231/14; C07D231/12; C07D231/40






- European:

C07D231/12B5; C07D231/14; C07D231/40; C07D401/12; C07D403/12; C07D405/12; C07D493/08

Application number: EP19930401614 19930623

Priority number(s): FR19920007645 19920623

Also published as:

 JP6073014 (A)
 FR2692575 (A1)
 FI932691 (A)
 BR9302435 (A)
 EP0576357 (B1)

more >>

Cited documents:

 EP0477049
 EP0418845
 EP0029363
 EP0248594

Report a data error here

Abstract of EP0576357

The subject of the invention is pyrazole derivatives of formula I: in which - g2, g3, g4, g5, g6 and w2, w3, w4, w5 and w6 are identical or different and independently represent hydrogen, a chlorine or bromine atom, a (C1-C3)alkyl, a (C1-C3)alkoxy, a trifluoromethyl or a nitro group and g4 optionally represents a phenyl group; - R4 represents hydrogen or a (C1-C3)alkyl; - X represents either a direct bond or a group -(CH2)x-N(R3)- in which R3 represents hydrogen or a (C1-C3)alkyl and x represents zero or one; - R represents a group -NR1R2, in which R1 and R2 independently represent a (C1-C6)alkyl group; an optionally substituted, nonaromatic (C3-C15)carbocyclic radical; an amino(C1-C4)alkyl group in which the amino is optionally disubstituted by a (C1-C3)alkyl; a cycloalkyl(C1-C3)alkyl in which the cycloalkyl is (C3-C12); a phenyl which is unsubstituted or substituted by a (C1-C3)alkyl; a naphthyl; an anthryl; a saturated, 5- to 8-membered heterocyclic radical which is unsubstituted or substituted by a (C1-C3)alkyl, hydroxyl or benzyl; a 1-adamantylmethyl; an aromatic heterocycle which is unsubstituted or substituted one or more times by a halogen, a (C1-C5)alkyl or a (C1-C5)alkoxy; a (C1-C3)alkyl which is substituted by an aromatic heterocycle which is unsubstituted or substituted one or more times by a halogen, a (C1-C5)alkyl or a (C1-C5)alkoxy; or else R1 is hydrogen and R2 is as defined above; or yet again R1 and R2 constitute, with the nitrogen atom to which they are bonded, a saturated, 5- to 8-membered heterocyclic radical, the said heterocyclic radical being other than morpholinyl when w2, w3, w4, w5, w6, g2, g3, g4, g5 and g6 are all hydrogen; a group R2 as defined above when X represents -(CH2)xN(R3)-; a group R5 when X represents a direct bond, R5 being represented by a (C1-C3)alkyl; a (C3-C12) cycloalkyl which is unsubstituted or substituted by a (C1-C5)alkyl; a phenyl(C1-C3)alkyl which is unsubstituted or substituted by a halogen or by a (C1-C5)alkyl; a cycloalkyl(C1-C3)alkyl in which the cycloalkyl is C3-C12 and is unsubstituted or substituted by a (C1-C5)alkyl; or a 2-norbornylmethyl; or one of their optional salts. Application: therapeutic treatment of pathological conditions where cannabis is involved.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : 93401614.8

(51) Int. Cl.⁵ : **C07D 231/14**, C07D 231/12,
C07D 231/40

(22) Date de dépôt : 23.06.93

(30) Priorité : 23.06.92 FR 9207645

(43) Date de publication de la demande :
29.12.93 Bulletin 93/52

(84) Etats contractants désignés :
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL
PT SE

(71) Demandeur : ELF SANOFI
32-34, rue Marbeuf
F-75008 Paris (FR)


(72) Inventeur : Barth, Francis, St. James - Ap.B17
Avenue Favre de Saint Castor
F-34080 Montpellier (FR)

Inventeur : Casellas, Pierre
Rue Carl von Linné no. 10
F-34000 Montpellier (FR)
Inventeur : Congy, Christian
58 Allée de la Marquise
F-34980 Saint Gely du Fosc (FR)
Inventeur : Martinez, Serge
17 Avenue d'Assas
F-34000 Montpellier (FR)
Inventeur : Carmona, Murielle
2 rue des Fontadières
F-34680 Saint Georges d'Orques (FR)

(74) Mandataire : Gillard, Marie-Louise et al
Cabinet Beau de Loménie 158, rue de
l'Université
F-75340 Paris Cédex 07 (FR)

(54) Dérivés du pyrazole, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant.

(57) L'invention a pour objet des dérivés du pyrazole de formule I :



(I)

dans laquelle

— g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et w₂, w₃, w₄, w₅, w₆ sont identiques ou différents, et représentent indépendamment l'hydrogène, un atome de chlore ou de brome, un (C₁-C₃) alkyle, un (C₁-C₃) alcoxy, un trifluorométhyle, un groupe niro et g₄ représente éventuellement un groupe phényle ;

— R₄ représente l'hydrogène ou un (C₁-C₃) alkyle ;

— X représente soit une liaison directe soit un groupe -(CH₂)_x-N(R₃)- dans lequel R₃ représente l'hydrogène ou un (C₁-C₃) alkyle et x représente zéro ou un ;

— R représente

— un groupe -NR₁R₂, dans lequel R₁ et R₂ représentent indépendamment un (C₁-C₆) alkyle ; un radical carbocyclique non aromatique en (C₃-C₁₆) éventuellement substitué ; un groupe amino (C₁-C₆) alkyle dans lequel l'atome de l'azote est éventuellement disubstitué par un (C₁-C₃) alkyle ; un cycloalkyl(C₁-C₃)alkyle dans lequel le cycloalkyle est en (C₃-C₁₂) ; un phényle non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, par un (C₁-C₆) alkyle, ou par un (C₁-C₆) alcoxy ; un phényl (C₁-C₃) alkyle ; un diphenyl (C₁-C₃) alkyle ; un naphthyle ; un anthracényle ; un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons non substitué ou substitué par un (C₁-C₃) alkyle, un hydroxyle ou un benzyle ; un 1-adamantylméthyle ; un hétérocycle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C₁-C₆) alkyle ou un (C₁-C₆) alcoxy ; un (C₁-C₃) alkyle substitué par un hétérocycle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C₁-C₆) alkyle ou un (C₁-C₆) alcoxy ; ou bien R₁ est l'hydrogène et R₂ est tel que défini ci-dessus ; ou bien encore R₁ et R₂ constituent avec l'atome d'azote

auquel ils sont liés, un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons, ledit radical hétérocyclique étant autre que morpholinyle lorsque w_2 , w_3 , w_4 , w_5 , w_6 , g_2 , g_3 , g_4 , g_5 et g_6 sont tous hydrogène ;

. un groupe R_2 tel que défini ci-dessus lorsque X représente $-(CH_2)_nN(R_3)-$;
 . un groupe R_5 lorsque X représente une liaison directe, R_5 étant représenté par un (C_1-C_3) alkyle ; un (C_3-C_{12}) cycloalkyle non substitué ou substitué par un (C_1-C_6) alkyle ; un phényl (C_1-C_6) alkyle non substitué ou substitué par un halogène ou par un (C_1-C_6) alkyle ; un cycloalkyl (C_1-C_3) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en C_3-C_{12} et est non substitué ou substitué par un (C_1-C_6) alkyle ; un 2-norbornylméthyle ; ou un de leurs sels éventuels.

Application : traitement thérapeutique des états pathologiques où le cannabis intervient.

La présente invention concerne de nouveaux dérivés du pyrazole, un procédé pour leur préparation et les compositions pharmaceutiques les contenant.

De nombreux dérivés du pyrazole ont été décrits dans la littérature ; plus particulièrement EP-A-268554 et DE-A-3910248 revendiquent des pyrazoles possédant des propriétés herbicides, EP-A-430186 et JP-A-03031840 revendiquent des composés utiles pour la photographie et EP-A-418845 revendique des pyrazoles pourvus d'activité anti-inflammatoire, analgésique et antithrombotique.

On a maintenant trouvé que les pyrazoles objet de l'invention ont une bonne affinité pour le récepteur des cannabinoïdes et sont de ce fait particulièrement intéressants dans les domaines thérapeutiques où le cannabis est connu pour intervenir.

Le Δ^9 -tétrahydrocannabinol ou Δ^9 -THC est le principal constituant actif extrait de *Cannabis sativa* (Tuner, 1985 ; In Marijuana 1984, Ed. Harvey, DY, IRL Press, Oxford).


Les effets des cannabinoïdes sont dus à une interaction avec des récepteurs spécifiques de haute affinité présents au niveau central (Devane et al., Molecular Pharmacology, 1988, 34, 605-613) et périphérique (Nye et al., The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1985, 234, 784-791 ; Kaminski et al., 1992, Molecular Pharmacology, 42, 736-742).

La caractérisation de ce récepteur a été rendue possible par la mise au point de ligands synthétiques spécifiques tels que le CP 55,940, agoniste analogue du Δ^9 -THC.

Les indications thérapeutiques des cannabinoïdes concernent des domaines variés tels que le système immunitaire, le système nerveux central, le système cardiovasculaire ou endocrinien (Hollister, Pharmacological Reviews, 1986, 38, 1-20, Renv and Sinha, Progress in Drug Research, 1991, 36, 71-114 et Cannabinoid receptor expression in human leucocytes, European Journal of Biochemistry, 1993, 214, 173-180).

Plus particulièrement, les composés pourvus d'une affinité pour le récepteur des cannabinoïdes possèdent une utilité en tant qu'immunomodulateurs, psychotropes, dans les troubles thyroïdiens, le vomissement, la myorelaxation, les neuropathies diverses, les troubles mnésiques, les dyskinésies, la migraine, l'asthme, l'épilepsie, le glaucome, encore dans la chimiothérapie anticancéreuse, dans l'ischémie et l'angor, dans d'hypertension orthostatique et dans l'insuffisance cardiaque.

Ainsi, la présente invention concerne selon un de ses aspects les composés de formule :



dans laquelle

- g_2, g_3, g_4, g_5, g_6 et w_2, w_3, w_4, w_5, w_6 sont identiques ou différents, et représentent indépendamment l'hydrogène, un atome de chlore ou de brome, un (C_1-C_3) alkyle, un (C_1-C_3) alcoxy, un trifluorométhyle, un groupe nitro et g_4 représente éventuellement un groupe phényle ;
- R_4 représente l'hydrogène ou un (C_1-C_3) alkyle ;
- X représente soit une liaison directe soit un groupe $-(CH_2)_x-N(R_3)-$ dans lequel R_3 représente l'hydrogène ou un (C_1-C_3) alkyle et x représente zéro ou un ;
- R représente
 - un groupe $-NR_2R_2$ dans lequel R_1 et R_2 représentent indépendamment un (C_1-C_6) alkyle ; un radical carbocyclique non aromatique en (C_3-C_{10}) éventuellement substitué ; un groupe amino (C_1-C_4) alkyle dans lequel l'atome de l'azote est éventuellement disubstitué par un (C_1-C_3) alkyle ; un cycloalkyl (C_1-C_3) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en (C_3-C_{12}) ; un phényle non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, par un (C_1-C_6) alkyle, ou par un (C_1-C_6) alcoxy ; un phényl (C_1-C_3) alkyle ; un diphenyl (C_1-C_3) alkyle ; un naphthyle ; un anthracényle ; un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons non substitué ou substitué par un (C_1-C_3) alkyle, un hydroxyle ou un benzyle ; un 1-adamantylméthyle ; un hétérocyle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C_1-C_3) alkyle ou un (C_1-C_6) alcoxy ; un (C_1-C_3) alkyle substitué par un hétérocycle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C_1-C_3) alkyle ou un (C_1-C_6)

alcoxy; ou bien R_1 est l'hydrogène et R_2 est tel que défini ci-dessus; ou bien encore R_1 et R_2 constituent avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons, ledit radical hétérocyclique étant autre que morpholinyle lorsque $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5$ et g_6 sont tous hydrogène;

un groupe R_2 tel que défini ci-dessus lorsque X représente $-(CH_2)_nN(R_3)-$;

un groupe R_5 lorsque X représente une liaison directe, R_5 étant représenté par un (C_1-C_3) alkyle; un (C_3-C_{12}) cycloalkyle non substitué ou substitué par un (C_1-C_6) alkyle; un phényl (C_1-C_3) alkyle non substitué ou substitué par un halogène ou par un (C_1-C_6) alkyle; un cycloalkyle (C_1-C_3) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en C_3-C_{12} et est non substitué ou substitué par un (C_1-C_6) alkyle; un 2-norbornylméthyle;

ou un de leurs sels éventuels.

Les radicaux carbocycliques non aromatiques en C_3-C_{16} comprennent les radicaux mono ou polycycliques, condensés ou pontés, saturés ou insaturés, éventuellement terpéniques. Ces radicaux sont éventuellement mono- ou poly-substitués, le ou lesdits substituants étant différents d'un groupe carbonyle substitué. Avantageusement les radicaux monocycliques sont substitués par au moins un groupe choisi parmi les groupes (C_1-C_6) alkyle, (C_1-C_6) alcoxy, les halogènes ou les radicaux hydroxy, étant entendu que dans le cas des terpènes ou des radicaux terpéniques, par exemple bornyle, menthyle ou menthényle, les groupes alkyles du terpène ne sont pas considérés comme des substituants.

Les radicaux monocycliques incluent les cycloalkyles par exemple cyclopropyle, cyclopentyle, cyclohexyle, cycloheptyle, cyclooctyle, cyclododécyle non substitués ou substitués par au moins un groupe (C_1-C_6) alkyle, un groupe (C_1-C_6) alcoxy, un halogène ou un groupe hydroxy.

Les radicaux di- ou tricycliques condensés, pontés, ou spiraniques, incluent par exemple les radicaux norbornyle, bornyle, isobornyle, noradamantyle, adamantyle, spiro[5,5]undécanyne, lesdits radicaux étant non substitués ou substitués par un (C_1-C_6) alkyle.

Par radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons, on entend un radical hétérocyclique non aromatique mono, di ou tricyclique condensé ou ponté, l'hétéroatome étant S, O ou N ou un radical hétérocyclique non aromatique monocyclique contenant un atome d'azote et un atome d'oxygène ou de soufre, lesdits radicaux étant par exemple tétrahydrofuranyle, tétrahydrothiofuranyle, tropyle, morpholinyle, thiomorpholinyle, pipéridinyle, pipérazinyle, pyrrolidinyle, quinuclidinyle; les radicaux 1-pyrrolidinyle, 1-pipéridinyle, 1-hexahydroazépinyne, 4-morpholinyle et 4-thiomorpholinyle étant avantageux.

Les hétérocycles aromatiques peuvent être mono- ou di-cycliques comme par exemple le pyrrolyle, le pyridyle, l'indolyne, la quinolinyle, la thiazolyne, l'isindazolyne, ces hétérocycles aromatiques étant non substitués ou substitués par exemple par des halogènes, des (C_1-C_6) alkyles, des (C_1-C_6) alcoxy. Les hétérocycles aromatiques préférés sont le pyridyle, le pyrrolyle, l'indole, les radicaux 2-indolyne et 3-indolyne étant particulièrement préférés.

Dans la formule (I) ci-dessus, de préférence au moins un des substituants $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5$ et g_6 est autre que l'hydrogène.

Dans la formule (I) ci-dessus, lorsque R représente un groupe NR_1R_2 , de préférence:

- R_1 est l'hydrogène ou un groupe alkyle en C_1-C_6 et R_2 est tel que défini ci-dessus pour (I); ou
- R_1 et R_2 représentent chacun un groupe alkyle en C_1-C_6 , ou un groupe cycloalkyle en C_3-C_6 ; ou
- R_1 est l'hydrogène ou un groupe alkyle en C_1-C_6 et R_2 est un groupe cycloalkyle (C_1-C_3) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en C_3-C_{12} , un radical carbocyclique non aromatique en (C_3-C_{16}) non substitué ou substitué comme indiqué précédemment, un phényl non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, par un (C_1-C_3) alkyle ou par un (C_1-C_3) alcoxy; un phényl (C_1-C_3) alkyle ou un (C_1-C_3) alkyle substitué par un 2- ou 3-indolyne.

De façon particulièrement préférée, lorsque, dans la formule (I) R représente un groupe $-NR_1R_2$, R_1 est l'hydrogène ou un alkyle en (C_1-C_6) et R_2 est un radical carbocyclique non aromatique en (C_3-C_{16}) , un cycloalkyle (C_1-C_3) alkyle où le cycloalkyle est en C_3-C_{16} , un 2- ou 3-indolyle (C_1-C_3) alkyle.

Les groupes alkyle préférés sont les groupes méthyle, éthyle, propyle et isopropyle.

Dans la formule (I) ci-dessus, R est avantageusement un groupe $-NR_1R_2$, de préférence choisi parmi les radicaux (1) à (74) ci-après.

Lorsque R_1 et R_2 , avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, représentent un radical hétérocyclique saturé, celui-ci est de préférence à 5, 6 ou 7 chaînons et peut contenir un autre hétéroatome, notamment l'oxygène ou le soufre, par exemple une pyrrolidine, un pipéridine, une hexahydroazépine, une morpholine ou une thiomorpholine, avec la limitation précisée ci-dessus.


Les radicaux représentés par R tel que défini pour (I) sont de préférence des radicaux choisis parmi :

- (1) propylamino
- (2) butylamino

- (3) isopropylamino
- (4) dipentylamino
- (5) 2-(N,N-diéthylamino)éthylamino
- 5 (6) benzylamino
- (7) 2-phényléthylamino
- (8) 3-phénylpropylamino
- (9) 3,3-diphénylpropylamino
- (10) phénylamino
- 10 (11) 3-chlorophénylamino
- (12) 4-méthylphénylamino
- (13) cyclopropylamino
- (14) cyclopentylamino
- (15) cyclohexylamino
- 15 (16) cycloheptylamino
- (17) cyclooctylamino
- (18) cyclododécylamino
- (19) 2-méthylcyclohexylamino
- (20) 3-méthylcyclohexylamino
- 20 (21) cis 4-méthylcyclohexylamino
- (22) trans 4-méthylcyclohexylamino
- (23) cis 4-tertiobutylcyclohexylamino
- (24) trans 4-tertiobutylcyclohexylamino
- (25) 4-hydroxycyclohexylamino
- 25 (26) 2-méthoxycyclohexylamino
- (27) 4-éthylcyclohexylamino
- (28) 2,6-diméthylcyclohexylamino
- (29) N-méthylcyclohexylamino
- (30) N,N-dicyclohexylamino
- 30 (31) endo-2-norbornylamino (ou endo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino)
- (32) exo-2-norbornylamino (ou exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino)
- (33) 1-adamantylamino
- (34) 2-adamantylamino
- (35) 1-noradamantylamino
- 35 (36) (1R)-bornylamino
- (37) (1R)-isobornylamino
- (38) spiro[5.5]undecanylamino
- (39) cyclohexylméthylamino
- (40) 1-adamantylméthylamino
- 40 (41) (2-tétrahydrofuranyl)méthylamino
- (42) 2-(N-méthyl-2-pyrrolyl)éthylamino
- (43) 2-(2-pyridinyl)éthylamino
- (44) (2-indolyl)méthylamino
- (45) N-méthyl(2-indolyl)méthylamino
- 45 (46) 2-(3-indolyl)éthylamino
- (47) N-méthyl 2-(3-indolyl)éthylamino
- (48) 4-(N-benzylpipéridinyl)amino
- (49) 3-quinuclidylamino
- (50) exo bicyclo[3.2.1]octan-2-amino
- 50 (51) bicyclo[2.2.2]octan-2-amino
- (52) chloro-3-bicyclo[3.2.1]oct-3-èn-2-amino
- (53) bicyclo[2.2.2]oct-2-èn-5-amino
- (54) exo bicyclo[3.2.1]octan-3-amino
- (55) endo bicyclo[3.2.1]octan-3-amino
- 55 (56) endo oxa-7-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
- (57) exo oxa-7-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
- (58) endo-tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]décan-8-amino
- (59) N-éthyl-1-adamantylamino
- (60) tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptan-3-amino


- (61) bicyclo[3.3.1]nonan-9-amino
 (62) endo-triméthyl-1,3,3-bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino (ou fenchylamino)
 (63) (1*R*,2*S*-endo) (+) bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 5 (64) (1*R*,2*R*-exo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 (65) (1*S*,2*R*-endo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 (66) (1*S*,2*S*-exo) (+) bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 (67) 1-pipéridinylamino
 (68) 1-pyrrolidinylamino
 10 (69) 1-hexahydroazépinyllamino
 (70) 4-morpholinylamino
 (71) 4-thiomorpholinylamino
 (72) N-méthyl exo bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 (73) N-éthyl exo bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino
 15 (74) N-propyl exo bicyclo[2.2.1]heptan-2-amino

Parmi les produits de formule (I) ci-dessus, ceux répondant à la formule (Ia) ci-après:



dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, g_2, g_3, g_4, g_5$ et R_4, R_1 et R_2 sont tels que définis pour (I) sont avantageux.

Parmi ces composés de formule (Ia), les composés de formule (Ia') :



dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, g_2, g_3, g_4, g_5$ et R_4 sont tels que définis ci-dessus pour (I), R_1 est l'hydrogène ou un C_1-C_8 alkyle et R_2 est un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} , ou un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons choisi parmi 1-pyrrolidyle, 1-pipéridyle, 1-hexahydroazépyle, 4-morphinyle et 4-thiomorphinyle et leurs sels, sont particulièrement avantageux.

Parmi les produits de formule (I), ceux répondant aux formules (Ia), (Ib), (Ic), (Id), (Ie) et (If) ci-dessous, où au moins l'un des substituants $w_2, w_3, w_4, w_5, g_2, g_3, g_4, g_5$ et g_6 est autre que l'hydrogène, R_1 est l'hydrogène ou un alkyle en C_1-C_8 , R_2 est tel que défini ci-dessus, R_3 est l'hydrogène ou un groupe alkyle en C_1-C_3 , R_4 est hydrogène ou méthyle et R_5 est un cycloalkyl(C_1-C_6)alkyle, le cycloalkyle étant en C_3-C_6 ou un phényl(C_1-C_6)alkyle non substitué ou substitué sur le cycle aromatique par un groupe méthyle ou un atome de fluor ou de chlore, et leurs sels éventuels, sont particulièrement avantageux.


Dans ces derniers produits particulièrement avantageux,

- lorsque R_1 représente un alkyle en C_1-C_8 , les groupes méthyle, éthyle, propyle et isopropyle sont pré-

férés;

- lorsque R_3 est un alkyle en C_1-C_3 , le groupe méthyle est préféré;
- les groupes R_2 préférés sont les radicaux carbocycliques non aromatiques en C_3-C_{15} non substitués ou substitués par un alkyle en C_1-C_4 , notamment méthyle, éthyle, propyle, isopropyle ou t-butyle, ou par deux ou trois groupes méthyle, par exemple les radicaux méthyl-, éthyl- ou t-butylcyclohexyles ou les radicaux diméthyl- ou triméthylcyclohexyles; les radicaux cycloalkyl(C_1-C_3)alkyles où le cycloalkyle est en C_3-C_6 ; les radicaux alkyle en C_1-C_3 substitués par un groupe 2- ou 3-indolyle; les radicaux 2- et 3-indolyle; et les radicaux 1-pyrrolidinyle, 1-pipéridinyle, 1-hexahydroazépinyne, 4-morpholinyle, 4-thiomorpholinyle;
- les groupes R_4 préférés sont les radicaux cyclohexylméthyle, cyclohexylethyle, benzyle, 4-méthylbenzyle et phénylethyle.

Parmi les produits de formule (I) ci-dessus, ceux représentés par la formule (i):




dans laquelle R_4 , X et R sont tels que définis ci-dessus pour (I), et leurs sels, sont très avantageux, notamment lorsque R_4 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle ou lorsque R_4 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle et X représente une liaison directe.

Les composés de formule (i) dans laquelle R_4 est l'hydrogène ou un groupe méthyle, X est une liaison directe et R représente un groupe $-NR_1R_2$ dans lequel R_1 est l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_2 est un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} ou un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons choisis parmi 1-pyrrolidinyle, 1-pipéridinyle, 1-hexahydroazépinyne, 4-morpholinyle et 4-thiomorpholinyle et leurs sels, sont particulièrement préférés.

Egalement particulièrement préférés sont les composés de formule (i) dans laquelle R_4 est l'hydrogène ou un groupe méthyle, X est $-(CH_2)_x-N(R_3)-$ et R est $-NR_1R_2$, x étant zéro ou un, R_1 étant l'hydrogène, R_2 étant l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_3 étant un phényle non substitué ou substitué par un ou deux atomes d'halogène, un groupe (C_1-C_6) alkyle ou un groupe (C_1-C_6) alcoxy ou un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} , et leurs sels.

Parmi les composés de formule (I), ceux répondant à la formule (ii):




dans laquelle X et R sont tels que définis ci-dessus pour (I) et w_4 est un groupe méthyle ou méthoxy, et leurs sels sont également avantageux, en particulier ceux de formule (ii) dans laquelle w_4 est un groupe méthyle ou méthoxy, X représente une liaison directe et R représente un groupe $-NR_1R_2$ dans lequel R_1 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_2 représente un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} , et leurs sels.

Une sous-classe avantageuse comprend les composés de formule (ii) dans laquelle w_4 est un groupe méthyle ou méthoxy, X représente un groupe $-(CH_2)_x-N(R_3)-$ dans lequel x est zéro ou un, R_3 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle, et R est un groupe $-NR_1R_2$ dans lequel R_1 représente l'hydrogène et R_2 représente

un phényle non substitué ou substitué par un ou deux atomes d'halogène, un groupe (C₁-C₆)alkyle ou un (C₁-C₆)alcoxy ou un radical carbocyclique non aromatique en C₃-C₁₅ ou leurs sels.


D'autres composés intéressants selon la présente invention sont ceux de formule (I) dans laquelle w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, g₂, g₃, g₄, g₅, g₆, R₄ et X sont tels que définis ci-dessus pour (I) et R représente un groupe -NR₁R₂ dans lequel R₁ est l'hydrogène ou un groupe (C₁-C₆)alkyle et R₂ est un groupe 2- ou 3-indolyl(C₁-C₃)alkyle ou un groupe 2- ou 3-indolyle et leurs sels.

Parmi ces derniers, les produits de formule (iii):



dans laquelle X est tel que défini ci-dessus pour (I), R est un groupe -NR₁R₂ dans lequel R₁ représente l'hydrogène ou un (C₁-C₆)alkyle et R₂ est un groupe 2- ou 3-indolyl(C₁-C₃)alkyle ou un groupe 2- ou 3-indolyle et soit w₂ est l'hydrogène et w₄ est un groupe méthyle ou méthoxy soit w₂ et w₄ représentent un atome de chlore, et leurs sels, sont particulièrement intéressants.

Des produits inclus dans la formule (I) ci-dessus, également intéressants sont ceux de formule (iv):




dans laquelle X et R sont tels que définis ci-dessus pour (I) et g₄ représente un atome de brome, un méthyle ou un trifluorométhyle et leurs sels.

Dans les produits préférés de formule (iv), les deux atomes de chlore sont dans les positions 2,3 ; 2,4 ; 2,5 ou 3,4 et dans ces produits préférés de formule (iv), ceux dont X est une liaison directe et R est un groupe -NR₁R₂ où R₁ est l'hydrogène ou un alkyle en C₁-C₆ et R₂ est un radical carbocyclique non aromatique contenant de 3 à 15 atomes de carbone sont particulièrement préférés.


Les sels éventuels des composés selon la présente invention, notamment de ceux ayant les formules (I), (Ia'), (I), (ii), (iii), et (iv) ci-dessus et (Ia), (Ib), (Ic), (Id), (Ie) et (If) ci-dessous, comprennent aussi bien ceux avec des acides minéraux ou organiques qui permettent une séparation ou une cristallisation convenable des produits, tels que l'acide picrique ou l'acide oxalique, que ceux qui forment des sels pharmaceutiquement acceptables tels que le chlorhydrate, le bromhydrate, le sulfate, l'hydrogénosulfate, le dihydrogénophosphate, le méthanesulfonate, le méthylsulfate, le maléate, le fumarate, le 2-naphtalènesulfonate, le glyconate, le gluconate, le citrate, l'iséthionate.

Selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne un procédé pour la préparation des composés (I) caractérisé en ce que l'on traite un dérivé de l'acide 3-pyrazolocarboxylique de formule:




dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I) ou une de ses formes activées, esters ou chlorures d'acides


soit avec une amine de formule HNR_1R_2 dans laquelle R_1 et R_2 sont tels que définis pour (I) pour obtenir les amides de formule:



dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_4, R_1$ et R_2 sont tels que définis pour (I), soit éventuellement avec une amine primaire R_3NH_2 dans laquelle R_3 est tel que défini pour (I) pour obtenir les amides intermédiaires (V) de formule:




dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_4$ et R_3 sont tels que définis pour (I) pour obtenir par réduction par un hydruure métallique les amines intermédiaires de formule:




dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_4$ et R_3 sont tels que définis pour (I), qui sont trans-

formées en amide ou en urée de formule:




20 dans lesquelles $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_2, R_3$ et R_4 sont tels que définis pour (I) par réaction avec respectivement un chlorure d'acide de formule $R_2\text{COCl}$ ou un isocyanate de formule $R_2\text{-N=C=O}$ dans lesquels R_2 est tel que défini pour (I),


25 soit avec un dérivé de l'azidure de diphenylphosphoryle en milieu basique suivi d'un traitement acide pour obtenir l'amine intermédiaire de formule:



40 dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I), qui est soumis à l'action d'un chlorure d'acide $R_2\text{COCl}$ ou d'un isocyanate $R_2\text{-N=C=O}$ pour obtenir respectivement des amides et les urées de formule:




dans lesquelles $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I) et R_3 représente l'hydrogène, les mêmes composés pour lesquels R_3 est différent de l'hydrogène étant préparés à partir de l'amine primaire (VII) ci-dessus transformée en amine secondaire de formule:



dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I) et R'_3 représente un (C_1-C_2) alkyle, qui sont ensuite soumises à l'action d'un chlorure d'acide R_2COCl ou d'un isocyanate $R_2-N=C=O$ pour obtenir les amides et les urées de formule (Id) et (Ie) telles que définies ci-dessus dans lesquelles R_3 est différent de l'hydrogène,

soit avec un réactif organomanganeux R_6MnX_1 dans lequel R_6 est tel que défini pour (I) et X_1 représente un halogène pour obtenir les dérivés cétoniques de formule:




les composés ainsi obtenus étant éventuellement transformés en l'un de leurs sels.

Selon un mode opératoire préférentiel, les pyrazoles de formule (I) peuvent être synthétisés à partir des esters correspondants, par transformation de la fonction ester en amide, urée ou cétone, via l'acide et le chlorure d'acide.

Lesdits esters sont synthétisés en appliquant la méthode décrite selon Berichte, 1887, 20,2185.

Le schéma réactionnel de préparation des composés (I) via leur ester méthylique ou éthylique ($Alk = CH_3$ ou C_2H_5) est représenté par le SCHEMA 1 ci-dessous.

SCHEMA 1



La première étape a) consiste en la préparation d'un sel de métal alcalin d'un dérivé de l'acétophénone de formule (IV) dans laquelle R₄ et g₂, g₃, g₄, g₅ et g₆ sont tels que définis ci-dessus pour (I) sur lequel est ensuite additionnée, une quantité équimolaire d'oxalate de diéthyle (étape b) pour obtenir le cétoester de formule (III).


Dans le cas où R₄ = H, le métal alcalin sera préférentiellement le sodium, et le sel du cétoester (III) (Alk = CH₃) sera obtenu selon Bull. Soc. Chim. Fr., 1947, 14, 1098 en utilisant le méthylate de sodium dans le méthanol pour effectuer l'étape a).

Dans le cas où R₄ = CH₃, le métal alcalin sera préférentiellement le lithium, et le sel du cétoester (III) (Alk = C₂H₅) sera obtenu selon J. Heterocyclic. Chem. 1989, 26, 1389 en utilisant le sel de lithium de l'hexaméthyl-disilazane dans l'éther éthylique pour effectuer l'étape a).


Les sels de métal alcalin (III) ainsi préparés et un excès de dérivé de l'hydrazine sont alors chauffés au reflux de l'acide acétique (étape c). Par précipitation dans l'eau glacée on obtient ainsi les 3-pyrazole esters (IIa).

Ces esters (IIa) sont ensuite transformés en leurs acides (IIb) par action d'un agent alcalin comme par exemple l'hydroxyde de potassium puis acidification (étape d).

Dans le SCHEMA 1 ci-dessus, les esters de formule (IIa) dans laquelle w₂ et w₄ sont un atome de chlore, w₃, w₅ et w₆ sont l'hydrogène, g₄ est un atome de chlore, g₂, g₃, g₅ et g₆ sont l'hydrogène et pour lesquels Alk représente un (C₁-C₅) alkyle et les acides (IIb) correspondants, sont des intermédiaires clés nouveaux pour la préparation des composés (I), particulièrement avantageux, et représentent donc un aspect ultérieur de l'invention ; ces composés répondent aux formules (II'a) ou (II'b).



Lorsque X est représenté par une liaison directe, les amides selon l'invention de formule (Ia) :




25

dans laquelle, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6 et $g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_1, R_2$ et R_4 sont tels que définis pour (I) sont préparés à partir d'un dérivé fonctionnel de l'acide (IIb), de préférence le chlorure, selon les méthodes habituelles afin de le substituer par une amine de formule HNR_1R_2 , préparée selon les méthodes habituelles, pour obtenir les composés (Ia) selon l'invention.

30


Lorsque X est représenté par un groupe $-(CH_2)_x-N(R_3)-$ dans lequel x et R_3 sont tels que définis pour (I), les amides et les urées selon l'invention de formule (Ib) et (Ic) :



50

dans lesquelles w_2, w_3, w_4, w_5, w_6 et $g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_2, R_3$ et R_4 sont tels que définis pour (I) sont préparés à partir de l'ester (IIa) décrit précédemment selon le SCHEMA 2 suivant :


SCHEMA 2



Le passage de l'ester (IIa) à l'amide intermédiaire (V) peut par exemple être effectué, via le chlorure d'acide correspondant, par réaction de celui-ci avec une amine R₃NH₂, dans un alcool comme par exemple l'éthanol.


La réduction de l'amide (V) en amine (VI) est ensuite effectuée par un hydruure métallique, tel l'hydruure de lithium et d'aluminium ou préférentiellement par le complexe BH₃-THF en solution dans le THF chauffé au reflux. L'amine (VI) est alors transformée en amide (Ib) ou en urée (Ic) selon l'invention par les méthodes conventionnelles, par exemple respectivement par réaction avec un chlorure d'acide R₂COCl ou avec un isocyanate R₂N=C=O.

Les amides et les urées selon l'invention de formule (Id) et (Ie) :



dans lesquelles g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, R₂, R₃ et R₄ sont tels que définis pour (I) sont préparés à partir des acides 3-pyrazolecarboxyliques obtenus précédemment selon le SCHEMA 3 suivant:

SCHEMA 3




Les acides (IIb) sont transformés en amines correspondantes (VII) par réaction de Curtius, en utilisant par exemple l'azide de diphenylphosphoryle en milieu basique suivi d'un traitement par un acide fort tel que l'acide chlorhydrique ou l'acide trifluoroacétique comme il est décrit dans Synthesis, 1990, 295. Les amines (VII) sont alors transformées en amides (Id) ou en urées (Ic) selon l'invention par les méthodes habituelles, telle que par exemple par réaction avec un chlorure d'acide R_2COCl dans le cas de (Id) avec $R_3 = H$ ou avec un isocyanate $R_2N = C = O$ dans le cas de (Ic) avec $R_3 = H$.

Alternativement les urées (Ic) avec $R_3 = H$ peuvent être préparées par la réaction inverse : les acides (IIb) sont transformés en isocyanates correspondants (VIIc) comme décrit dans J. Org. Chem. 1961, 26, 3511 selon le SCHEMA 4 ci-après.

La réaction des isocyanates (VIIc) avec une amine R_2NH_2 conduit alors directement aux urées (Ic).


SCHEMA 4



Pour préparer les composés (Id) et (Ie) pour lesquels R_3 est différent de l'hydrogène, les amines primaires (VII) sont préalablement transformées en amines secondaires (VIb) par une séquence réactionnelle telle que la réaction avec un chlorure d'acide $R'_3\text{COCl}$ (avec $R'_3 = (C_1-C_2)$ alkyle), suivi d'une réduction de l'amide (VIIa) obtenu, par exemple par réaction avec BH_3 dans le THF. Dans le cas où R_3 représente un méthyle, on utilise préférentiellement la réaction des amines (VII) avec le dicarbonate de tertiobutyle, $(\text{BOC})_2\text{O}$, ou avec un mélange d'acide formique et d'anhydride acétique qui conduisent respectivement au carbamate (VIIa, $Z = \text{O}t\text{Bu}$) ou au formamide (VIIa, $Z = \text{H}$), produits que l'on réduit ensuite, par exemple par LiAlH_4 pour obtenir les amines (VIb, $R_3 = \text{CH}_3$).

Les amines secondaires (VIb) sont ensuite transformées en amides (Id) ou en urées (Ie) selon l'invention comme décrit ci-dessus.


Les dérivés cétoniques selon l'invention de formule (If) :



(If, X = liaison directe et R = R₅)

dans laquelle g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, R₄ et R₅ sont tels que définis pour (I) sont préparés préférentiellement à partir des acides 3-pyrazolcarboxyliques (Ib) décrits précédemment selon le SCHEMA 5 suivant:


SCHEMA 5



Les acides (Ib) sont transformés en chlorures d'acides selon les méthodes classiques; ces derniers sont ensuite transformés en dérivés cétoniques (If) selon l'invention par réaction avec un réactif organomanganeux approprié, R_5MnX_1 dans lequel R_5 est tel que défini pour (I) et X_1 représente un halogène, de préférence un atome de chlore, en utilisant par exemple la méthode décrite dans Tetrahedron Letters, 1989, 30, 7369.

Alternativement, les dérivés cétoniques (If) peuvent être préparés à partir des acides (Ib) via les nitriles (Iic) selon le SCHEMA 6 suivant:

SCHEMA 6



La transformation de (IIb) en (IIc) est effectuée par une méthode classique telle que, par exemple, la transformation en chlorure d'acide suivie d'amination (NH_3 -THF-eau) et déshydratation de l'amide obtenu, par exemple, par traitement par CH_3SO_2Cl dans la pyridine comme décrit dans J. Am. Chem. Soc., 1955, 77, 1701.

Les nitriles (IIc) ainsi obtenus sont ensuite traités par des réactifs organométalliques préférentiellement organomagnésiens de formule R_5MgX_1 pour fournir, après traitement acide, les dérivés cétoniques (II).

Les composés de formule (I) ainsi obtenus sont isolés, sous forme de base libre ou éventuellement de sel, selon les techniques classiques.

Lorsque le composé de formule (I) est obtenu sous forme de base libre, la salification est effectuée par traitement avec l'acide choisi dans un solvant organique. Par traitement de la base libre, dissoute par exemple dans un alcool tel que l'isopropanol, avec une solution de l'acide choisi dans le même solvant, on obtient le sel correspondant qui est isolé selon les techniques classiques. Ainsi, on prépare par exemple le chlorhydrate, le bromhydrate, le sulfate, l'hydrogénosulfate, le dihydrogénophosphate, le méthanesulfonate, l'oxalate, le maléate, le fumarate, le 2-naphtalènesulfonate.

A la fin de la réaction, les composés de formule (I) peuvent éventuellement être isolés sous forme d'un de leurs sels, par exemple le chlorhydrate ou l'oxalate; dans ce cas, s'il est nécessaire, la base libre peut être préparée par neutralisation dudit sel avec une base minérale ou organique, telle que l'hydroxyde de sodium ou la triéthylamine ou avec un carbonate ou bicarbonate alcalin, tel que le carbonate ou bicarbonate de sodium ou de potassium.

Les amines de formule HNR_1R_2 sont soit disponibles commercialement, soit décrites dans la littérature ou soit préparées par des méthodes connues selon les PREPARATIONS décrites ci-après.

Parmi ces amines, les amines préférées sont par exemple celles citées ci-après:


(1) bicyclo[3.2.1]octan-2-ylamine préparée selon H. Maskill et al., J. Chem. Soc. Perkin II, 1984, 119 ;




(2) bicyclo[2.2.2]octan-2-ylamine préparée selon R. Seka et al., Ber. 1942, 1379 ;



(3) endo et exo bicyclo[3.2.1]octan-3-ylamine préparées selon H. Maskill et al., J. Chem. Soc. Perkin Trans II, 1984, 1369 ;



(4) endo et exo oxa-7-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine préparées selon W.L. Nelson et al., J. Heterocyclic Chem., 1972, 9, 561 ;



(5) endo-tricyclo[5.2.1.0^{2,6}]décan-8-amine préparée selon G. Buchbauer et al., Arch. Pharm., 1990, 323, 367 ;



(6) endotriméthyl-1,3,3-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine préparée selon Ingersoll et al., J. Am. Chem. Soc., 1951, 73, 3360 ;



(7) 3-méthylcyclohexylamine préparée selon Smith et al., J. Org. Chem., 1952, 17, 294 ;



(8) 2,6-diméthylcyclohexylamine préparée selon Cornubert et al., Bull. Soc. Chim. Fr., 1945, 12, 367 ;

5



(9) 2-méthoxycyclohexylamine préparée selon Noyce et al., J. Am. Soc., 1954, 76, 768 ;


10



15

(10) 4-éthylcyclohexylamine préparée selon A. Shirahata et al., Biochem. Pharmacol., 1991, 41, 205 ;

20



(11) bicyclo[2.2.2]oct-2-èn-5-amine préparée selon H.L. Goering et al., J. Am. Chem. Soc., 1961, 83, 1391 ;


25



30

(12) N-éthyl-1-adamantylamine préparée selon V.L. Narayanan et al., J. Med. Chem., 1972, 15, 443 ;

35



(13) tricyclo[2.2.1.0^{2,5}]heptan-3-ylamine préparée selon G. Muller et al., Chem. Ber., 1965, 98, 1097;

40



(14) N-méthyl-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine préparée selon W.G. Kabalka et al., Synth. Commun., 1991, 20, 231;

45



50

Les amines R_3NH_2 sont disponibles commercialement ou préparées selon des méthodes connues.

Les chlorures d'acides R_2COCl sont disponibles commercialement ou préparés à partir des acides correspondants selon les méthodes connues.

55 Les isocyanates $R_2N-C=O$ sont également disponibles commercialement ou préparés à partir des amines correspondantes (réaction au phosgène) ou des acides correspondants (réarrangement de Curtius) selon les méthodes connues.

Les composés selon l'invention ont fait l'objet d'essais biochimiques.

Les composés (I) et leurs sels éventuels ont montré une bonne affinité *in vitro* pour les récepteurs aux

cannabinoides dans des essais réalisés selon les conditions expérimentales décrites par Devane et al., Molecular Pharmacology, 1988, 34, 605-613.

Les composés selon l'invention possèdent également une affinité pour les récepteurs aux cannabinoides présents sur des préparations d'organes isolés stimulés électriquement. Ces essais ont été réalisés sur l'iléon de cobaye et sur le vas deferens de souris selon Roselt et al., Acta Physiologica, Scandinavia, 1975, 94, 142-144 et selon Nicolau et al., Arch. Int. Pharmacodyn., 1978, 236, 131-136.

Les composés selon l'invention sont généralement administrés en unités de dosage.

Lesdites unités de dosage sont de préférence formulées dans des compositions pharmaceutiques dans lesquelles le principe actif est mélangé avec un excipient pharmaceutique.

Ainsi, selon un autre de ses aspects, la présente invention concerne des compositions pharmaceutiques renfermant, en tant que principe actif, un composé de formule (I) ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

Les composés de formule (I) ci-dessus et leurs sels pharmaceutiquement acceptables peuvent être utilisés à des doses journalières de 0,01 à 100 mg par kilo de poids corporel du mammifère à traiter, de préférence à des doses journalières de 0,1 à 50 mg/kg. Chez l'être humain, la dose peut varier de préférence de 0,5 à 4000 mg par jour, plus particulièrement de 2,5 à 1000 mg selon l'âge du sujet à traiter ou le type de traitement : prophylactique ou curatif.

Dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention pour l'administration orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, transdermique, locale ou rectale, les principes actifs peuvent être administrés sous formes unitaires d'administration, en mélange avec des supports pharmaceutiques classiques, aux animaux et aux êtres humains. Les formes unitaires d'administration appropriées comprennent les formes par voie orale telles que les comprimés, les gélules, les poudres, les granules et les solutions ou suspensions orales, les formes d'administration sublinguale et buccale, les formes d'administration sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intranasale ou intraoculaire et les formes d'administration rectale.

Dans les compositions pharmaceutiques de la présente invention, le principe actif est généralement formulé en unités de dosage contenant de 0,5 à 1000 mg, de préférence de 1 à 2000 mg dudit principe actif par unité de dosage.

Lorsque l'on prépare une composition solide sous forme de comprimés, on mélange le principe actif principal avec un véhicule pharmaceutique tel que la gélatine, l'amidon, le lactose, le stéarate de magnésium, le talc, la gomme arabique ou analogues. On peut enrober les comprimés de saccharose ou d'autres matières appropriées ou encore les traiter de telle sorte qu'ils aient une activité prolongée ou retardée et qu'ils libèrent d'une façon continue une quantité prédéterminée de principe actif.

On obtient une préparation en gélules en mélangeant le principe actif avec un diluant et en versant le mélange obtenu dans des gélules molles ou dures.

Une préparation sous forme de sirop ou d'elixir peut contenir le principe actif conjointement avec un édulcorant, acalorique de préférence, du méthylparaben et du propylparaben comme antiseptique, ainsi qu'un agent donnant du goût et un colorant approprié.

Les poudres ou les granules dispersibles dans l'eau peuvent contenir le principe actif en mélange avec des agents de dispersion ou des agents mouillants, ou des agents de mise en suspension, comme la polyvinylpyrrolidone, de même qu'avec des édulcorants ou des correcteurs du goût.

Pour une administration rectale, on recourt à des suppositoires qui sont préparés avec des liants fondant à la température rectale, par exemple du beurre de cacao ou des polyéthylène glycols.

Pour une administration parentérale, intranasale ou intraoculaire, on utilise des suspensions aqueuses, des solutions salines isotoniques ou des solutions stériles et injectables qui contiennent des agents de dispersion et/ou des agents mouillants pharmacologiquement compatibles, par exemple le propylène glycol ou le butylène glycol.

Pour une administration par inhalation on utilise un aérosol contenant par exemple du trioléate de sorbitane ou de l'acide oléique ainsi que du trichlorofluorométhane, du dichlorotétrafluoréthane ou tout autre gaz propulseur biologiquement compatible.

Le principe actif peut être formulé également sous forme de microcapsules, éventuellement avec un ou plusieurs supports ou additifs.

Le principe actif peut être également présenté sous forme de complexe avec une cyclodextrine, par exemple α , β ou γ cyclodextrine, 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrine ou méthyl- β -cyclodextrine.

Les composés de formule (I) ainsi formulés peuvent être utilisés pour le traitement de l'immunomodulation, de la migraine, de l'asthme, de l'épilepsie, du glaucome, de la maladie de Parkinson, des dyskinésies, des neuropathies, des troubles mnésiques et thymiques, des vomissements, de l'ischémie, de l'angor, de l'hypotension orthostatique ou de l'insuffisance cardiaque.

Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois la limiter.

Les points de fusion ou de décomposition des produits, F, ont été mesurés en tube capillaire avec un appareil de Tottoli.

L'excès énantiomérique des amines optiquement actives, e.e., a été déterminé par RMN du ^{19}F après réaction avec le chlorure d'acide de Mosher S (+) selon J. Org. Chem., 1969, 34, 2543.

Les pouvoirs rotatoires, $[\alpha]_D^{20}$, ont été mesurés à $c = 1$ dans l'éthanol.

PREPARATIONS

A. AMINES NHR_1R_2

1. (1*R*,2*S*-endo) (+) bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

L'acide (1*R*,2*S*-endo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylique est préparé selon Tetrahedron Letters, 1985, 26, 3095.

Par une réaction de Curtius effectuée selon J. Org. Chem., 1961, 26, 3511, il est ensuite transformé en amine correspondante (1*R*,2*S*-endo) (+).

$[\alpha]_D^{20} = +13,4^\circ$ ($c = 1$, EtOH).

e.e. > 95 % δ (CF_3) = 6,67 ppm par rapport à $\text{CF}_3\text{CO}_2\text{H}$.

2. (1*R*,2*R*-exo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

L'acide (1*R*,2*S*-endo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylique préparé dans l'exemple précédent est transformé en son isomère (1*R*,2*R*-exo) (-) selon J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 950 puis transformé comme décrit dans l'exemple précédent en amine correspondante (1*R*,2*R*-exo) (-).

$[\alpha]_D^{20} = -17,7^\circ$ ($c = 1$, EtOH).

e.e. > 94 % (déterminé comme ci-dessus, δ (CF_3) = 6,81 ppm).

3. (1*S*,2*R*-endo) (-) bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

L'acide (1*S*,2*R*-endo) (+) bicyclo[2.2.1]heptan-2-carboxylique est préparé selon Tetrahedron Letters, 1989, 30, 5595 puis transformé comme décrit précédemment en amine correspondante (1*S*,2*R*-endo) (-).

e.e. > 95 % (déterminé comme ci-dessus, δ (CF_3) = 6,62 ppm).

4. (1*S*,2*S*-exo) (+) bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

L'acide (1*S*,2*R*-endo) (+) préparé dans l'exemple précédent est transformé en son isomère (1*S*,2*S*-exo) (+) selon J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 950 puis celui-ci est converti en l'amine correspondante (1*S*,2*S*-exo) (+) comme décrit précédemment.

e.e. > 94 % (déterminé comme ci-dessus, δ (CF_3) = 6,91 ppm).

5. exo-3-chlorobicyclo[3.2.1]oct-3-ényl-2-amine.

Une solution de 6,1 g d'exo-3-chloro-2-azidobicyclo[3.2.1]oct-3-ène obtenu selon J. Chem. Soc. Perkin Trans II, 1984, 119 dans 600 ml d'éthanol et 60 ml de CHCl_3 est additionnée de 0,4 g de PtO_2 et hydrogénée dans un appareil de Parr à 4 bars et température ambiante jusqu'à disparition de la fonction azide. Après filtration sur célite, le mélange réactionnel est évaporé et le résidu est cristallisé dans un mélange éthanol/ CHCl_3 . On obtient 0,49 g du chlorhydrate de l'amine attendue, $F > 240^\circ\text{C}$.

6. N-éthyl-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

6.1. N-acétyl-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

Une solution de 3,50 ml de chlorure d'acétyle dans 10 ml de CH_2Cl_2 est ajoutée goutte à goutte à une solution de 5,00 g d'exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine et 6,90 ml de triéthylamine dans 50 ml de CH_2Cl_2 refroidie à 0°C . Après 16 heures d'agitation à température ambiante, le mélange est versé dans 100 ml d'eau glacée, et la phase organique est séparée et lavée par une solution d'HCl à 5 % puis à l'eau puis par une solution saturée de NaCl. Après séchage sur MgSO_4 et évaporation des solvants on obtient 5,80 g de l'acétamide attendu, $F = 128^\circ\text{C}$.

6.2. N-éthyl-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

Une solution de 5,10 g du dérivé précédent dans 30 ml de THF est ajoutée goutte à goutte sur une suspension de 2,18 g de LiAlH_4 dans 30 ml de THF refroidie à 0°C puis le mélange est chauffé à reflux pendant 8 heures. Le mélange est hydrolysé à 0°C par 2,2 ml d'eau puis 2,2 ml de solution de NaOH à 15 % puis 7,5 ml d'eau. Après 15 minutes d'agitation le précipité est filtré et lavé au THF, le filtrat est évaporé puis repris dans 50 ml d'éther éthylique. Cette solution étherée est extraite par HCl 5 % ; la phase aqueuse obtenue est neutralisée par NaOH 30 % puis extraite à l'éther éthylique. Après lavage par une solution saturée de NaCl, séchage sur MgSO_4 et évaporation on obtient 3,82 g de liquide jaune pâle. Par dissolution dans l'éther éthylique et traitement par une solution d'HCl gaz dans l'éther éthylique anhydre on obtient un précipité blanc que l'on filtre, lave à l'éther éthylique et sèche sous vide. On obtient ainsi 4,16 g du chlorhydrate de l'amine attendue, $F = 145^\circ\text{C}$ (décomposition).

7. N-(n-propyl)-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

7.1. N-propionyl-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

Cet amide est obtenu de la même façon que l'analogue N-acétyl décrit dans l'exemple 6 précédent, en utilisant le chlorure de propionyle au lieu du chlorure d'acétyl.

7.2. N-(n-propyl)-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylamine.

Cette amine est obtenue au départ de l'amide précédent, de la même façon que l'analogue N-éthyl décrit dans l'exemple précédent. Par salification par HCl/Et₂O dans un mélange Et₂O/iPr₂O on obtient le chlorhydrate de l'amine attendue, F = 230°C (décomposition).

8. Bicyclo[3.3.1]nonan-9-ylamine.

8.1. Bicyclo[3.3.1]nonan-9-onoxime.



Une solution de 1,83 g de chlorhydrate d'hydroxylamine et de 2,95 g d'acétate de sodium dans 22 ml d'eau est ajoutée à une solution de 2,43 g de bicyclo[3.3.1]nonan-9-one dans 9 ml de méthanol, et le mélange est chauffé à reflux pendant 24 heures. Après refroidissement, le mélange est extrait à l'éther éthylique, les phases organiques sont lavées par une solution de NaCl saturée puis par une solution de Na₂CO₃ à 5 %, puis à l'eau, séchées sur MgSO₄ et évaporées. On obtient 3,00 g d'oxime, F = 151°C.

8.2. Bicyclo[3.3.1]nonan-9-ylamine.

Une solution de 1,00 g d'oxime dans 250 ml d'éthanol et 4 ml de CHCl₃ est additionnée de 0,20 g de PtO₂ et hydrogénée dans un appareil de Parr à 6 bars et température ambiante pendant 18 heures. Après filtration sur célite, les solvants sont évaporés et le résidu est cristallisé dans un mélange éthane/n-heptane. On obtient 0,55 g de chlorhydrate de l'amine attendue. F > 240°C.

EXEMPLE 1

N-(2-adamantyl)-1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide



A) Sel de sodium du 4-chlorobenzoylpyruvate de méthyle.

12 g de sodium sont dissous dans 250 ml de méthanol anhydre. On ajoute ensuite un mélange de 64,6 ml de 4-chloroacétophénone et 67,1 ml d'oxalate de diéthyle dans 600 ml de méthanol en maintenant la température inférieure à 10°C. Le mélange réactionnel est ensuite agité à température ambiante pendant 3 heures puis on ajoute 1 l d'éther sec. On agite encore pendant 20 minutes, filtre, lave le précipité à l'éther et le sèche sous vide pour obtenir 74,6 g du sel de sodium attendu.

B) Ester méthylique de l'acide 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylique.

Une suspension de 26,3 g du sel de sodium obtenu précédemment et 23,5 g de chlorhydrate de 2,4-dichlorophénylhydrazine dans 250 ml d'acide acétique est chauffée à reflux pendant 4 heures. Après refroidissement, le mélange est versé sur 250 g de glace, les cristaux obtenus sont filtrés, lavés à l'eau et séchés sous vide pour fournir 26,3 g d'ester, F=167°C.

C) Acide 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylique.

Une solution de 3,70 g de KOH dans 35 ml d'eau est ajoutée à une solution de 10,0 g d'ester obtenu précédemment dans 35 ml de méthanol. Le mélange est chauffé à reflux pendant 4 heures, refroidi à température ambiante et versé dans 100 ml d'eau puis neutralisé par une solution d'HCl à 5 %. Les cristaux obtenus sont filtrés, lavés à l'eau puis au pentane et séchés sous vide. On obtient 9,50 g d'acide, F = 185°C.

D) Chlorure de l'acide 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylique.

5,8 ml de chlorure de thionyle sont ajoutés à une suspension de 9,50 g de l'acide obtenu précédemment dans 100 ml de toluène et le mélange est chauffé à reflux pendant 3 heures. Le solvant est ensuite évaporé puis le résidu est repris dans 50 ml de toluène et le solvant est rééaporé (processus répété deux fois). On obtient 8,28 g de chlorure d'acide.

E) N-(2-adamantyl)-1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide


Une solution de 0,50 g du chlorure d'acide obtenu précédemment dans 10 ml de CH₂Cl₂ est ajoutée goutte à goutte à une solution de 0,30 g de chlorhydrate de 2-adamantanamine et de 0,41 ml de triéthylamine dans 10 ml de CH₂Cl₂ refroidie à 0°C. Le mélange est ensuite agité à température ambiante pendant

16 heures puis versé dans 30 ml d'eau glacée. Le mélange est extrait au CH_2Cl_2 et la phase organique est lavée successivement avec une solution d'HCl à 5 %, à l'eau, par une solution de Na_2CO_3 à 5 % puis par une solution de NaCl saturée. Après séchage sur MgSO_4 et évaporation du solvant, le produit brut est cristallisé dans le benzène à chaud pour donner 0,32 g de cristaux blancs, $F = 203^\circ\text{C}$.

EXEMPLE 2

N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

(I) : $w_2 = \text{Cl}$; $g_4 = \text{Cl}$; $R_4 = \text{H}$;



A) trans-4-triméthylsilyloxycyclohexylamine.


Une solution de 1,85 ml de chlorotriméthylsilane dans 10 ml de CH_2Cl_2 est ajoutée goutte à goutte à une solution de 2,0 g de chlorhydrate de trans-4-hydroxycyclohexylamine et de 4,05 ml de triéthylamine dans 20 ml de CH_2Cl_2 refroidie à 0°C . Après 16 heures d'agitation à température ambiante, le mélange est hydrolysé à l'eau et extrait. La phase organique est lavée successivement à l'eau, par une solution de Na_2CO_3 à 5 % et de NaCl saturée. Après séchage sur MgSO_4 et évaporation des solvants, on obtient 1,43 g d'amine (liquide incolore).

B) N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

Une solution de 0,80 g de chlorure d'acide préparé précédemment selon l'exemple 1D) dans 10 ml de CH_2Cl_2 est ajoutée goutte à goutte à une solution de 0,35 g de trans-4-triméthylsilyloxycyclohexylamine et 0,32 ml de triéthylamine dans 10 ml de CH_2Cl_2 refroidie à 0°C . Après 16 heures d'agitation à température ambiante le mélange est versé dans 30 ml d'eau glacée, et extrait au CH_2Cl_2 . La phase organique est lavée successivement par HCl à 5 % et par une solution de NaCl saturée puis séchée sur MgSO_4 et évaporée. Le produit brut est dissous dans 15 ml de THF ; on ajoute à la solution 15 ml d'HCl à 5 % et agite pendant 1 heure. Le mélange est alors extrait à l'éther et lavé à l'eau puis séché sur MgSO_4 et évaporé pour donner après cristallisation dans CH_3OH , 0,20 g du pyrazole attendu, $F = 209^\circ\text{C}$.

En procédant selon l'EXEMPLE 1 ci-dessus, à partir, par exemple, des dérivés acides ou esters ci-dessous décrits dans le TABLEAU A, on prépare les composés décrits dans les TABLEAUX I à XII ci-après.

TABLEAU A





w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	g_2	g_4	F; °C Z = H	F; °C Z = CH ₃
H	H	CH ₃	H	H	H	Cl	185	98
H	Cl	Cl	H	H	H	Cl	162	147
H	Cl	Cl	H	H	H	CH ₃	188	145
Cl	H	H	Cl	H	H	CH ₃	232	132
Cl	H	H	Cl	H	H	CF ₃	214	179
Cl	Cl	H	H	H	H	CH ₃	214	101
H	H	CH ₃	H	H	Cl	Cl	188	102
H	H	Cl	H	H	Cl	Cl	224	118
H	H	OCH ₃	H	H	H	Cl	168	-
Cl	H	Cl	H	Cl	H	Cl	255	214
Cl	H	Cl	H	H	H		115	138
Cl	H	Cl	H	H	H	Br	188	177
H	H	NO ₂	H	H	H	CH ₃	106	166

TABLEAU I




Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \diagup \\ -\text{N} \\ \diagdown \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Scl
3	-NH-(CH ₂) ₂ -CH ₃	100	
4	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ -\text{NH}-(\text{CH}_2)_2-\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	102	
5	-NH-(CH ₂) ₃ -C ₆ H ₅	60	
6	-NH-(CH ₂) ₄ -CH ₃	97	
7	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ -\text{NH}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	152	
8	$\begin{array}{c} \text{C}_5\text{H}_{11} \\ \diagup \\ -\text{N} \\ \diagdown \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	(1)	
9	-NH- 	152	

TABLEAU I (suite 1)












Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
10		148	
11		162	
12		83	
13		132	
14		186	
		165	
16		134	
17		144	
18		174	
19		188	
20		120	

TABLEAU I (suite 2)

Exemple n°	$ \begin{array}{c} R_1 \\ \diagup \\ -N \\ \diagdown \\ R_2 \end{array} $	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
21		208	
22		81	
23		122	
24		188	
25		194	
26		190	
27		183 + 14,1*	

TABLEAU I (suite 3)








Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
28	 NH- endo (-)	182 - 14,1°	
29	 NH- endo	178	
30	 NH- exo (+,-)	191	
31	 -NH- exo (+)	185 + 10,2°	
32	 NH- exo (-)	184 - 10,6°	
33	 NH- exo	170	
34	 -NH- exo	198	

TABLEAU I (suite 4)









Exemple n°	$\begin{array}{c} R_1 \\ \\ -N \\ \\ R_2 \end{array}$	F; °C ou [α] _D ²⁰ Scl
35	 endo	182
36	 exo	188
37		141
38		197
39		209
40		164
41	 endo	184
42	 exo	180

TABLEAU I (suite 5)










Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
43		233	
44		220	
45	 (+)	156 +11,7°	
46	 (-)	151 -61,6°	
47		168	
48		108	
49		161	
50		154	
51		112	

TABLEAU I (suite 6)

Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
52		159	
53		149	
54		125	
55		220	
56		118	
57		158	
58		234	HCl
59		96	
60		95	

TABLEAU I (suite 7)
















Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
61		179	
62		172	
63		215 (déc)	HCl
64		184	
65		195(déc)	HCl
66		158	
67		147	
68		186	
69		205	HCl

TABLEAU I (suite 8)

Exemple n°		F ; °C ou [α] _D ²⁰	Sel
70		136	
71		208	
72		162	
73		139	

(1) Spectre de RMN du composé de l'exemple 8 ; (200MHz, DMSO d⁶) : 0,74 (3H, t J = 5Hz, CH₃) ; 0,91 (3H, t J = 5Hz, CH₃) ; 1,41-1,69 (12H, m, 6CH₂) ; 3,43 (2H, t, NCH₂) ; 3,66 (2H, s, NCH₂) ; 7,06 (1H, s, H pyrazole) ; 7,29 (2H, d J = 8Hz, Har) ; 7,49 (2H, d J = 8Hz, Har) ; 7,62-7,77 (2H, m, Har) ; 7,92 (1H, d J = 2Hz, Har).

TABLEAU II




Exemple n°		F ; °C
74	-NH-(CH ₂) ₂ -CH ₃	95

TABLEAU II (suite)






Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \diagup \\ -\text{N} \\ \diagdown \\ \text{R}_2 \end{array}$	F; °C
75	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{NH}-\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	114
76	$\begin{array}{c} \text{C}_5\text{H}_{11} \\ \diagup \\ -\text{N} \\ \diagdown \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	59
77	$\begin{array}{c} \text{---NH---CH}_2 \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array}$ 	175
78	$\begin{array}{c} \text{---NH---(CH}_2\text{)}_2 \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array}$ 	178
79	$\begin{array}{c} \text{---N---(CH}_2\text{)}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array}$ 	175
80		147

TABLEAU III



Exemple n°		F ; °C
81		144
82		165
83		143
84		155
85		153
86		129

TABLEAU III (suite 1)
















Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \diagup \\ -\text{N} \\ \diagdown \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C
87		140
88		148
89		137
90	 cis + trans	63
91	 exo (+, -)	156
92	 exo (-)	149 - 15,1°
93	 exo (+)	149 + 15,1°
94	 exo	(2)
95	 exo	48

TABLEAU III (suite 2)

Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F ; °C
96	 <chem>CCNCC12CC3CC1CC2C3</chem>	57
97	 <chem>CN12CC3CC1CC2C3</chem>	157
98	 <chem>N12CC3CC1CC2C3</chem>	168
99	 <chem>ClC12CC3CC1CC2C3</chem>	156
100	 <chem>NCCc1ccccc1C23CC4CC2CC3C4</chem>	112


(2) Spectre de RMN du composé de l'exemple 94 (200MHz, DMSO d⁶) : 1,14-1,80 (10H, m, norbornyle) 2,34 (3H, s, CH₃ tolyle) ; 3,12 (3H, se, NCH₃) ; 4,40 (1H, t, N-CH norbornyle) ; 6,90 (1H, s, H pyrazole) ; 7,23-7,31 (2H, m, Har) ; 7,71-7,77 (5H, m, Har).

TABLEAU IV




Exemple n°		F; °C
101		154
102		149
103		136
104		165
105		134

TABLEAU V




Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F; °C
106	-NH-	205
107	-NH-	175
108	-N-	214
109	HN-	240
110	$\text{H}_5\text{C}_2\text{-N-}$	124
111	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-N-} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	124

TABLEAU VI




Exemple n°		F; °C
112		215
113		55
114		168

TABLEAU VII




Exemple n°		F; °C
115		193
116		168
117		152
118		216
119		154
120		102

TABLEAU VIII



Exemple n*		F; °C
121		146
122		115
123		119
124		115
125		112

TABLEAU IX



20

25

30

35

40


45

50

55

Exemple n°		F; °C
126		150
127		142
128		159
129		108

TABLEAU X



Exemple n°		F; °C
130	$-\text{NH}-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_3$	144
131		115
132	$-\text{NH}-$	123
133		108
134		120
135	 exo	169
136	 exo	68

TABLEAU X (suite)





Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F; °C
137	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{exo} \end{array}$ 	58
138		182
139		152

TABLEAU XI












Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	F; °C
140		260
141		191
142		182

TABLEAU XII



Exemple n°		g ₄	w ₆	F ; °C
143		Br	H	130
144		Cl	Cl	224
145		Br	H	148
146		Cl	Cl	245
147		Br	H	206
148		Cl	Cl	231
149		Br	H	201


TABLEAU XII (suite)

Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_1 \\ \\ -\text{N} \\ \\ \text{R}_2 \end{array}$	g ₄	w ₆	F ; °C
150			H	165
151		Br	H	209
152			H	204

EXEMPLE 153

N-(2-adamanty)-1-(2,4-dichlorophényl)-4-méthyl-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide.

(I) : g₄ = Cl ; w₂, w₄ = Cl ; R₄ = CH₃ ;



A) Sel de lithium du 2,4-dioxo-(4-chlorophényl)butanoate d'éthyle.

80 ml de solution du sel de lithium de l'hexaméthylsilazane 1,0 M dans le THF sont introduits dans 240 ml d'éther anhydre. Le mélange est refroidi à -78°C et une solution de 10,12 g de 4-chloropropiophénone dans 50 ml d'éther est introduite goutte à goutte. Après 30 minutes d'agitation à -78°C, on introduit rapidement une solution de 9,16 ml d'oxalate de diéthyle dans 50 ml d'éther puis on laisse remonter la température et on agite pendant 5 heures à température ambiante. Le précipité jaune pâle formé est filtré, lavé à l'éther et séché sous vide. On obtient 6,32 g du sel attendu.

B) Ester éthylique de l'acide 1-(2,4-dichlorophényl)-4-méthyl-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxylique.


Cet ester est obtenu de la même façon que dans l'exemple 1B) à partir du sel de lithium obtenu précédemment, et purifié par recristallisation dans l'éther isopropylique. F = 105°C.

C) Composé 153.

Cet amide est obtenu à partir de l'ester précédent de la même façon que dans l'exemple 1C), 1D) et 1E), par transformation de l'ester en chlorure d'acide et réaction de celui-ci avec la 2-adamantanamine et purification par recristallisation dans l'éther isopropylique. F = 190°C.

En procédant selon l'exemple 153 ci-dessus on prépare les amides décrits dans le TABLEAU XIII ci-après.


TABLEAU XIII



Exemple n°	NH-R ₂	F ; °C
154		78
155		85
156		148
157		155
158		201

EXEMPLE 159 N-[1-(para-tolyl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-ylméthyl]-N-méthylcyclo-hexylcarboxamide.

(I) : g₄ = Cl ; w₄ = CH₃ ; R₄ = H ;



A) N-méthyl-1-(p-tolyl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide.

0,50 g de chlorure de l'acide 1-(4-méthylphényl)-5-(4-chlorophényl)-3-pyrazole-carboxylique en solution dans 5 ml de CH₂Cl₂ sont ajoutées goutte à goutte à 100 ml d'une solution de méthylamine à 33 % dans l'éthanol. Après 2 heures d'agitation à température ambiante on concentre sous vide, reprend le résidu à l'aide d'un mélange Na₂CO₃ 5 % + AcOEt, décante, lave la phase organique avec une solution saturée de NaCl, sèche sur MgSO₄ et évapore les solvants. Le résidu est repris dans l'éther isopropylique, les cristaux obtenus sont filtrés et séchés sous vide. On obtient 0,44 g de l'amide attendu, F = 138°C.

B) N-méthyl-[1-(p-tolyl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]méthylamine.


8,76 d'amide obtenu précédemment dissous dans 25 ml de THF anhydre sont ajoutés goutte à goutte à une température comprise entre 0 et 5°C à 75 ml d'une solution 1,0M de BH_3 dans le THF. Après retour à température ambiante, on chauffe le mélange réactionnel à reflux pendant 16 heures puis on coule en refroidissant au bain de glace 18 ml d'HCl 6N. On agite pendant 1 heure et demie à température ambiante puis distille le THF et concentre sous vide. Le mélange réactionnel est alors alcalinisé par NaOH en pastille jusqu'à pH = 9-10 ; on extrait à l'acétate d'éthyle, sèche sur MgSO_4 , évapore les solvants et purifie le brut obtenu par chromatographie sur gel de silice (300 g), éluant: $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 97/3 (v/v). On obtient 6,0 g d'amine, F = 85°C.

C) Composé 159

A une solution de 0,46 g d'amine précédente dans 10 ml de CH_2Cl_2 on ajoute successivement 0,62 ml de triéthylamine puis une solution de 0,23 g de chlorure d'acide cyclohexanoïque dans 5 ml de CH_2Cl_2 . Après 15 minutes d'agitation à température ambiante, le mélange réactionnel est concentré sous vide et le résidu est repris par 30 ml d'eau et extrait à l'acétate d'éthyle. La phase organique est lavée successivement par Na_2CO_3 5 %, à l'eau puis avec une solution saturée de NaCl, séchée sur MgSO_4 puis les solvants sont évaporés. Le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice (25 g), éluant : toluène/AcOEt 70/30 (v/v). Les fractions de produit pur sont concentrées sous vide et le résidu est recristallisé de l'éther isopropylique. On obtient 0,38 g d'amide, F = 124°C.

En procédant selon l'EXEMPLE 159 ci-dessus, on prépare les amides décrits dans les TABLEAUX XIV et XV ci-dessous.

TABLEAU XIV



Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{--N--C--R}_2 \\ \quad \\ \text{R}_3 \quad \text{O} \end{array}$	F; °C
160	$\begin{array}{c} \text{--NH--C--} \\ \quad \quad \quad \diagup \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{Cyclohexyl} \end{array}$	178
161	$\begin{array}{c} \text{--NH--C--} \\ \quad \quad \quad \diagup \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{Cycloheptyl} \end{array}$	148
162	$\begin{array}{c} \text{--NH--C--} \\ \quad \quad \quad \diagup \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl} \end{array}$	148
163	$\begin{array}{c} \text{--N--C--} \\ \quad \quad \diagup \\ \text{CH}_3 \quad \text{O} \quad \text{Cyclohexyl} \end{array}$	123
164	$\begin{array}{c} \text{--NH--C--} \\ \quad \quad \quad \diagup \\ \text{O} \quad \quad \quad \text{4-chlorophenyl} \end{array}$	142

TABLEAU XIV (suite)






Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{N}-\text{C}-\text{R}_2 \\ \\ \text{R}_3 \\ \text{O} \end{array}$	F; °C
165		175
166		225
167		155
168		228

TABLEAU XV




Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{---N---C---R}_2 \\ \parallel \\ \text{O} \\ \\ \text{R}_3 \end{array}$	F ; °C
169		103
170		166
171		165

EXEMPLE 172

N-[1-(2,4-Dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl-méthyl]-N'-(4-chlorophényl)urée.

(I) : $g_4 = \text{Cl}$; $w_2, w_4 = \text{Cl}$; $R_4 = \text{H}$;



A) 1-(2,4-Dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide.

Cet amide est obtenu de la même façon que l'exemple 159A par réaction du chlorure d'acide décrit dans l'exemple 1D avec une solution saturée d'ammoniac dans l'éthanol. F = 178°C.

B) [1-(2,4-Dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]méthylamine.


Cette amine est obtenue de la même façon que l'exemple 159B par réduction de l'amide précédemment obtenue avec BH_3 dans le THF.

C) Composé 172.

0,20 g de 4-chlorophénylisocyanate sont additionnés à 0,45 g d'amine précédente en solution dans 10 ml de toluène et le mélange réactionnel est agité à température ambiante pendant 16 heures. Le solvant est évaporé et le résidu est repris dans 20 ml d'acétate d'éthyle, lavé à l'eau puis séché sur MgSO_4 et les solvants sont évaporés. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice (20 g), éluant : toluène/AcOEt 60/40 (v/v). La concentration des fractions de produit pur fournit un résidu qui est recristallisé dans un mélange isopropanol/éther isopropylique. On obtient 0,18 g d'urée attendue, F = 172°C.

En procédant selon l'EXEMPLE 172 ci-dessus, on prépare les urées décrites dans le TABLEAU XVI ci-après.

TABLEAU XVI



Exemple n°	$\begin{array}{c} \text{R}_3 \\ \\ \text{-X-N-C-NH-R}_2 \\ \\ \text{O} \end{array}$	w ₂	w ₄	F ; °C
173	$\text{-CH}_2\text{-NH-C(=O)-NH-}$	Cl	Cl	122
174	$\text{-CH}_2\text{-NH-C(=O)-NH-}$	Cl	Cl	88


TABLEAU XVI (suite)

Exemple n°	$\begin{array}{c} R_3 \\ \\ -X-N-C-NH-R_2 \\ \\ O \end{array}$	w ₂	w ₄	F ; °C
175	$-CH_2-NH-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$	Cl	Cl	120
176	$\begin{array}{c} -CH_2-N-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl} \\ \\ CH_3 \end{array}$	Cl	Cl	157
177	$-CH_2-NH-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_3(\text{Cl})_2$	Cl	Cl	157
178	$-CH_2-NH-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OCH}_3$	Cl	Cl	138
179	$-CH_2-NH-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl}$	H	CH ₃	183
180	$\begin{array}{c} -CH_2-N-C(=O)-NH-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Cl} \\ \\ CH_3 \end{array}$	H	CH ₃	148

EXEMPLE 181

N-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]cyclohexylcarboxamide.

(I) : g₄ = Cl ; w₂, w₄ = Cl ; R₄ = H ;



A) N-(Tertibutoxycarbonyl)-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]amine.

A une solution de 2,05 ml d'azidure de diphenylphosphoryle dans 40 ml de t-butanol anhydre, on ajoute 3,25 g de l'acide 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-3-pyrazolecarboxylique obtenu selon l'exemple 1C) puis 1,32 ml de triéthylamine et on chauffe le mélange réactionnel à reflux sous azote pendant 12 heures. Après refroidissement, le mélange réactionnel est traité par une solution saturée de NaHCO₃ et extrait à l'acétate d'éthyle. Après lavage à l'eau puis par une solution de NaCl saturée, séchage sur MgSO₄ et évaporation des solvants, le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice 70-230 mesh, éluant : CH₃OH/CH₂Cl₂ 1/99 (v/v). On obtient 1,09 g du produit attendu.

B) Chlorhydrate de 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl-ammonium.

1,09 g du produit précédent sont dissous dans 20 ml d'une solution saturée d'HCl dans EtOH diluée

à 50 % et le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 2 heures. Le solvant est ensuite évaporé et le résidu est trituré dans l'acétate d'éthyle à reflux puis filtré et séché sous vide. On obtient 0,55 g du chlorhydrate.


C) Composé 181.

Une solution de 0,11 ml de chlorure de l'acide cyclohexanecarboxylique dans 2 ml de CH_2Cl_2 est ajoutée goutte à goutte à une solution de 0,20 g du chlorhydrate obtenu dans l'exemple précédent et 0,19 ml de triéthylamine dans 5 ml de CH_2Cl_2 . Après 24 heures d'agitation à température ambiante le mélange est lavé successivement avec une solution d'HCl 5 %, à l'eau, avec une solution de Na_2CO_3 5 % puis avec une solution de NaCl saturée, séché sur MgSO_4 , puis les solvants sont évaporés. Le produit brut est cristallisé dans iPr_2O . On obtient 0,12 g de l'amide attendu, $F = 213^\circ\text{C}$.

EXEMPLE 182

N-méthyl-N-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]adamantyl-1-carboxamide.

(I) : $w_2 = w_4 = \text{Cl}$; $g_4 = \text{Cl}$; $R_4 = \text{H}$;



A) N-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]formamide.

Dans un mélange de 4 ml d'acide formique et 0,5 ml d'anhydride acétique refroidi au bain de glace on ajoute par petites portions 0,50 g de 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-ylamine obtenu dans l'exemple précédent. Après 30 mn d'agitation les solvants sont évaporés sous vide et le résidu est repris dans l'éther isopropylique. Le solide blanc obtenu est filtré, lavé à l'éther isopropylique et séché sous vide. On obtient 0,49 g du formamide attendu, $F = 181^\circ\text{C}$.


B) N-méthyl-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]amine.

Une solution de 1,15 g du formamide obtenu dans l'exemple précédent dans 10 ml de THF anhydre est ajoutée goutte à goutte à température ambiante sur une suspension de 0,24 g de LiAlH_4 dans 40 ml de THF anhydre. Le mélange est ensuite chauffé à reflux pendant 20 minutes, refroidi à 0°C et hydrolysé par 0,24 ml d'eau puis 0,24 ml de NaOH à 15 % puis 0,72 ml d'eau. Après 20 minutes d'agitation à température ambiante, on filtre, lave au THF et évapore le filtrat à sec. Le résidu est repris dans l'éther isopropylique, filtré et séché sous vide. On obtient 1,02 g d'amine attendue, $F = 157^\circ\text{C}$.

C) Composé 182

En procédant comme dans l'exemple 181C, la réaction de l'amine précédemment obtenue avec le chlorure de l'acide adamantane-1-carboxylique conduit à l'amide attendu qui est purifié par chromatographie sur colonne de silice ; éluant : AcOEt/toluène 7:93, $F = 65^\circ\text{C}$.

TABLEAU XVII





Exemple n°	R ₃	R ₂	F; °C
183	H		284
184	H		291

TABLEAU XVII (suite)

Exemple n°	R ₃	R ₂	F; °C
185	H		164
186	CH ₃		127

EXEMPLE 187

N-méthyl-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]-N'-(4-chlorophényl)urée.



A une suspension de 0,40 g de 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-ylamine obtenue

par neutralisation du chlorhydrate obtenu dans l'exemple 181B dans 15 ml de toluène on ajoute 225 mg de 4-chlorophénylisocyanate et on chauffe le mélange à 40°C pendant 1 heure puis on laisse réagir à température ambiante pendant 16 heures. Le précipité obtenu est filtré, lavé au toluène et séché sous vide. On obtient 0,46 g de l'urée attendue, F = 215°C.

EXEMPLE 188

N-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]-N'-(1-adamanty)urée.

(I) : $w_2 = w_4 = \text{Cl}$; $g_4 = \text{Cl}$; $R_4 = \text{H}$;


$\text{-X-CO-R} = \text{NH-CO-NH}$



A) A une solution de 10,0 g du chlorure d'acide obtenu selon l'exemple 1D dans 320 ml d'acétone refroidie à 0°C on ajoute une solution de 2,54 g d'azoture de sodium dans 10 ml d'eau. Après 1 heure d'agitation à 0°C, le précipité obtenu est filtré et lavé à l'acétone puis séché sous vide. On obtient 9,86 g de l'azoture d'acyle attendu.

B) N-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]-N'-(1-adamanty)-urée.

Une solution de 1,00 g d'azoture d'acyle obtenu dans l'exemple précédent dans 5 ml de toluène est chauffée à reflux pendant 30 minutes. Après retour à température ambiante on ajoute à la solution d'isocyanate ainsi obtenue 0,39 g de 1-adamantanamine et agite le mélange pendant 1 heure et demie. Le précipité obtenu est filtré, lavé au toluène puis à l'éther isopropylique puis purifié par trituration dans un mélange acétone/méthanol. Après séchage sous vide, on obtient 0,48 g de l'urée attendue, F = 244°C.



TABLEAU XVIII

(Ie)

Exemple n°	R ₃	R ₂	F; °C
189	H		227
190	CH ₃		144

EXEMPLE 191



1-Cyclohexylméthyl-[1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]-cétone.



2,5 ml d'une solution 0,625 M de $MnLi_2Cl_4$ dans le THF (Tetrahedron 1989, 45, 4163) sont refroidis à 0°C et on y ajoute goutte à goutte 3,12 ml d'une solution 0,50M de bromure de méthylcyclohexylmagnésium dans le THF puis le mélange réactionnel est agité à 0°C pendant 2 heures. Le mélange réactionnel est alors refroidi à -10°C et une solution de 0,50 g du chlorure d'acide préparé selon l'exemple 1D), dans 8 ml de THF, est ajoutée goutte à goutte. Le mélange est agité à température ambiante pendant 5 heures puis hydrolysé par une solution saturée de NH_4Cl , extrait à l'éther, lavé à l'eau puis par une solution saturée de NaCl. Après séchage sur $MgSO_4$ et évaporation des solvants, le produit brut est purifié par chromatographie sur gel de silice 230-400 mesh, éluant : $AcOEt$ /hexane 5/95 (v/v). On obtient ainsi 0,09 g de cétone attendue, $F = 118^\circ C$.

EXEMPLE 192

1-[1-(2,4-Dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-(méthyl-4-phényl)-1-éthanone.




A) 1-(2,4-Dichlorophényl)-3-cyano-5-(4-chlorophényl)-pyrazole.

Une solution de 0,70 g de 1-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole-3-carboxamide obtenu selon l'exemple 172A et 0,74 ml de chlorure de mésyle dans 6 ml de pyridine est chauffée à 50°C pendant 8 heures. Le solvant est évaporé sous vide et le résidu dissous dans 20 ml de CH_2Cl_2 . On lave successivement avec une solution d' HCl à 5 % puis à l'eau, puis par une solution saturée de NaCl, on sèche sur $MgSO_4$ puis évapore le solvant. Le résidu est cristallisé dans l'éther isopropylique. On obtient 0,66 g du nitrile attendu, $F = 123^\circ C$.

B) Composé 192

6,3 ml d'une solution de chlorure de méthyl-4-benzylmagnésium, 1,0M dans l'éther éthylique sont ajoutés goutte à goutte sur une solution de 0,73 g du nitrile précédent dans 20 ml d'éther éthylique. Après 2 heures de réaction à température ambiante le mélange est hydrolysé par 50 ml d'acide chlorhydrique à 5 % et le mélange biphasique résultant est agité pendant 30 minutes. Le précipité rose formé est filtré, lavé à l'eau et à l'éther éthylique puis dissous dans 100 ml de CH_2Cl_2 et agité 30 minutes en présence d'environ 10 g de silice humide. La silice est ensuite filtrée, le filtrat évaporé et le résidu cristallisé dans un mélange CH_2Cl_2/Pr_2O . On obtient 0,37 g de la cétone attendue. $F = 175^\circ C$.


TABLEAU XIX



Exemple n°	R ₅	F ; °C
193		129
194		152

Revendications

1. Composé de formule :




dans laquelle

- g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et w₂, w₃, w₄, w₅, w₆ sont identiques ou différents, et représentent indépendamment l'hydrogène, un atome de chlore ou de brome, un (C₁-C₃) alkyle, un (C₁-C₃) alcoxy, un trifluorométhyle, un groupe nitro et g₄ représente éventuellement un groupe phényle ;
- R₄ représente l'hydrogène ou un (C₁-C₃) alkyle ;
- X représente soit une liaison directe soit un groupe -(CH₂)_x-N(R₃)- dans lequel R₃ représente l'hydrogène ou un (C₁-C₃) alkyle et x représente zéro ou un ;
- R représente
 - un groupe -NR₁R₂, dans lequel R₁ et R₂ représentent indépendamment un (C₁-C₆) alkyle ; un radical carbocyclique non aromatique en (C₃-C₁₅) éventuellement substitué ; un groupe amino (C₁-C₄) alkyle dans lequel l' amino est éventuellement disubstitué par un (C₁-C₃) alkyle ; un cy-


cycloalkyl(C₁-C₃) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en (C₃-C₁₂) ; un phényle non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, par un (C₁-C₆) alkyle, ou par un (C₁-C₆) alcoxy ; un phényl (C₁-C₃) alkyle ; un diphenyl (C₁-C₆) alkyle ; un naphtyl ; un anthracényle ; un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons non substitué ou substitué par un (C₁-C₃) alkyle, un hydroxyle ou un benzyle ; un 1-adamantylméthyle ; un hétérocycle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C₁-C₆) alkyle ou un (C₁-C₆) alcoxy ; un (C₁-C₃) alkyle substitué par un hétérocycle aromatique non substitué ou substitué une ou plusieurs fois par un halogène, un (C₁-C₆) alkyle ou un (C₁-C₆) alcoxy ; ou bien R₁ est l'hydrogène et R₂ est tel que défini ci-dessus ; ou bien encore R₁ et R₂ constituent avec l'atome d'azote auquel ils sont liés, un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons, ledit radical hétérocyclique étant autre que morpholinyle lorsque w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, g₂, g₃, g₄, g₅ et g₆ sont tous hydrogène ; un groupe R₃ tel que défini ci-dessus lorsque X représente -(CH₂)_nN(R₃)- ; un groupe R₃ lorsque X représente une liaison directe, R₃ étant représenté par un (C₁-C₃) alkyle ; un (C₃-C₁₂) cycloalkyle non substitué ou substitué par un (C₁-C₆) alkyle ; un phényl (C₁-C₃) alkyle non substitué ou substitué par un halogène ou par un (C₁-C₆) alkyle ; un cycloalkyl (C₁-C₃) alkyle dans lequel le cycloalkyle est en C₃-C₁₂ et est non substitué ou substitué par un (C₁-C₆) alkyle ; un 2-norbornylméthyle ; ou un de leurs sels éventuels.

2. Composé selon la revendication 1 de formule :



dans laquelle w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et R₄ sont tels que définis pour (I) dans la revendication 1, R₁ est l'hydrogène ou un C₁-C₆ alkyle et R₂ est un radical carbocyclique non aromatique en C₃-C₁₅ ou un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons choisi parmi 1-pyrrolidinyle, 1-pipéridinyle, 1-hexahydroazépinyne, 4-morpholinyle et 4-thiomorpholinyle ou un de ses sels.

3. Composé selon la revendication 1 de formule :




dans laquelle R₄, X et R sont tels que définis pour (I) dans la revendication 1 ou un de ses sels.

4. Composé de formule (I) selon la revendication 3 dans laquelle R₄ représente l'hydrogène ou un groupe méthyle ou un de ses sels.
5. Composé de formule (I) selon la revendication 4 dans laquelle R₃ est hydrogène ou méthyle et X représente une liaison directe ou un de ses sels.

6. Composé de formule (i) selon la revendication 3 dans laquelle R_4 est hydrogène ou méthyle, X est liaison directe et R représente un groupe $-NR_1R_2$ dans lequel R_1 est l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_2 est un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} ou un radical hétérocyclique saturé de 5 à 8 chaînons choisis parmi 1-pyrrolidinyne, 1-pipéridinyne, 1-hexahydroazépine, 4-morpholinyne et 4-thiomorpholinyne ou un de ses sels.

7. Composé de formule (i) selon la revendication 3 dans lequel R_4 est hydrogène ou méthyle, X est $-(CH_2)_x-N(R_3)-$, R est $-NR_1R_2$, x étant zéro ou un, R_1 étant l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_2 étant un phényle non substitué ou substitué par un ou deux atomes d'halogène, un groupe (C_1-C_6) alkyle ou un groupe (C_1-C_6) alcoy ou un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} ou un de ses sels.

8. Composé selon la revendication 1 de formule :



dans laquelle X et R sont tels que définis dans la revendication 1, et w_4 représente un groupe méthyle ou un groupe méthoxy ou un de ses sels.


9. Composé de formule (ii) selon la revendication 8 dans laquelle w_4 est méthyle ou méthoxy, X représente une liaison directe et R représente un groupe $-NR_1R_2$ dans lequel R_1 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle et R_2 représente un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} ou un de ses sels.

10. Composé selon la revendication 8 dans lequel w_4 est méthyle ou méthoxy, X représente un groupe $-(CH_2)_x-N(R_3)-$ dans lequel x est zéro ou un et R_3 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle et R représente un groupe $-NR_1R_2$ où R_1 représente l'hydrogène et R_2 représente un phényle non substitué ou substitué par un ou deux atomes d'halogène, un groupe (C_1-C_6) alkyle ou un (C_1-C_6) alcoy ou un radical carbocyclique non aromatique en C_3-C_{15} , ou un de ses sels.

11. Composé selon la revendication 1 de formule (i) dans laquelle w_2 , w_3 , w_4 , w_5 , w_6 , w_7 , w_8 , w_9 , w_{10} , w_{11} , w_{12} , w_{13} , w_{14} , w_{15} , w_{16} , w_{17} , w_{18} , w_{19} , w_{20} , w_{21} , w_{22} , w_{23} , w_{24} , w_{25} , w_{26} , w_{27} , w_{28} , w_{29} , w_{30} , w_{31} , w_{32} , w_{33} , w_{34} , w_{35} , w_{36} , w_{37} , w_{38} , w_{39} , w_{40} , w_{41} , w_{42} , w_{43} , w_{44} , w_{45} , w_{46} , w_{47} , w_{48} , w_{49} , w_{50} , w_{51} , w_{52} , w_{53} , w_{54} , w_{55} , w_{56} , w_{57} , w_{58} , w_{59} , w_{60} , w_{61} , w_{62} , w_{63} , w_{64} , w_{65} , w_{66} , w_{67} , w_{68} , w_{69} , w_{70} , w_{71} , w_{72} , w_{73} , w_{74} , w_{75} , w_{76} , w_{77} , w_{78} , w_{79} , w_{80} , w_{81} , w_{82} , w_{83} , w_{84} , w_{85} , w_{86} , w_{87} , w_{88} , w_{89} , w_{90} , w_{91} , w_{92} , w_{93} , w_{94} , w_{95} , w_{96} , w_{97} , w_{98} , w_{99} , w_{100} , w_{101} , w_{102} , w_{103} , w_{104} , w_{105} , w_{106} , w_{107} , w_{108} , w_{109} , w_{110} , w_{111} , w_{112} , w_{113} , w_{114} , w_{115} , w_{116} , w_{117} , w_{118} , w_{119} , w_{120} , w_{121} , w_{122} , w_{123} , w_{124} , w_{125} , w_{126} , w_{127} , w_{128} , w_{129} , w_{130} , w_{131} , w_{132} , w_{133} , w_{134} , w_{135} , w_{136} , w_{137} , w_{138} , w_{139} , w_{140} , w_{141} , w_{142} , w_{143} , w_{144} , w_{145} , w_{146} , w_{147} , w_{148} , w_{149} , w_{150} , w_{151} , w_{152} , w_{153} , w_{154} , w_{155} , w_{156} , w_{157} , w_{158} , w_{159} , w_{160} , w_{161} , w_{162} , w_{163} , w_{164} , w_{165} , w_{166} , w_{167} , w_{168} , w_{169} , w_{170} , w_{171} , w_{172} , w_{173} , w_{174} , w_{175} , w_{176} , w_{177} , w_{178} , w_{179} , w_{180} , w_{181} , w_{182} , w_{183} , w_{184} , w_{185} , w_{186} , w_{187} , w_{188} , w_{189} , w_{190} , w_{191} , w_{192} , w_{193} , w_{194} , w_{195} , w_{196} , w_{197} , w_{198} , w_{199} , w_{200} , w_{201} , w_{202} , w_{203} , w_{204} , w_{205} , w_{206} , w_{207} , w_{208} , w_{209} , w_{210} , w_{211} , w_{212} , w_{213} , w_{214} , w_{215} , w_{216} , w_{217} , w_{218} , w_{219} , w_{220} , w_{221} , w_{222} , w_{223} , w_{224} , w_{225} , w_{226} , w_{227} , w_{228} , w_{229} , w_{230} , w_{231} , w_{232} , w_{233} , w_{234} , w_{235} , w_{236} , w_{237} , w_{238} , w_{239} , w_{240} , w_{241} , w_{242} , w_{243} , w_{244} , w_{245} , w_{246} , w_{247} , w_{248} , w_{249} , w_{250} , w_{251} , w_{252} , w_{253} , w_{254} , w_{255} , w_{256} , w_{257} , w_{258} , w_{259} , w_{260} , w_{261} , w_{262} , w_{263} , w_{264} , w_{265} , w_{266} , w_{267} , w_{268} , w_{269} , w_{270} , w_{271} , w_{272} , w_{273} , w_{274} , w_{275} , w_{276} , w_{277} , w_{278} , w_{279} , w_{280} , w_{281} , w_{282} , w_{283} , w_{284} , w_{285} , w_{286} , w_{287} , w_{288} , w_{289} , w_{290} , w_{291} , w_{292} , w_{293} , w_{294} , w_{295} , w_{296} , w_{297} , w_{298} , w_{299} , w_{300} , w_{301} , w_{302} , w_{303} , w_{304} , w_{305} , w_{306} , w_{307} , w_{308} , w_{309} , w_{310} , w_{311} , w_{312} , w_{313} , w_{314} , w_{315} , w_{316} , w_{317} , w_{318} , w_{319} , w_{320} , w_{321} , w_{322} , w_{323} , w_{324} , w_{325} , w_{326} , w_{327} , w_{328} , w_{329} , w_{330} , w_{331} , w_{332} , w_{333} , w_{334} , w_{335} , w_{336} , w_{337} , w_{338} , w_{339} , w_{340} , w_{341} , w_{342} , w_{343} , w_{344} , w_{345} , w_{346} , w_{347} , w_{348} , w_{349} , w_{350} , w_{351} , w_{352} , w_{353} , w_{354} , w_{355} , w_{356} , w_{357} , w_{358} , w_{359} , w_{360} , w_{361} , w_{362} , w_{363} , w_{364} , w_{365} , w_{366} , w_{367} , w_{368} , w_{369} , w_{370} , w_{371} , w_{372} , w_{373} , w_{374} , w_{375} , w_{376} , w_{377} , w_{378} , w_{379} , w_{380} , w_{381} , w_{382} , w_{383} , w_{384} , w_{385} , w_{386} , w_{387} , w_{388} , w_{389} , w_{390} , w_{391} , w_{392} , w_{393} , w_{394} , w_{395} , w_{396} , w_{397} , w_{398} , w_{399} , w_{400} , w_{401} , w_{402} , w_{403} , w_{404} , w_{405} , w_{406} , w_{407} , w_{408} , w_{409} , w_{410} , w_{411} , w_{412} , w_{413} , w_{414} , w_{415} , w_{416} , w_{417} , w_{418} , w_{419} , w_{420} , w_{421} , w_{422} , w_{423} , w_{424} , w_{425} , w_{426} , w_{427} , w_{428} , w_{429} , w_{430} , w_{431} , w_{432} , w_{433} , w_{434} , w_{435} , w_{436} , w_{437} , w_{438} , w_{439} , w_{440} , w_{441} , w_{442} , w_{443} , w_{444} , w_{445} , w_{446} , w_{447} , w_{448} , w_{449} , w_{450} , w_{451} , w_{452} , w_{453} , w_{454} , w_{455} , w_{456} , w_{457} , w_{458} , w_{459} , w_{460} , w_{461} , w_{462} , w_{463} , w_{464} , w_{465} , w_{466} , w_{467} , w_{468} , w_{469} , w_{470} , w_{471} , w_{472} , w_{473} , w_{474} , w_{475} , w_{476} , w_{477} , w_{478} , w_{479} , w_{480} , w_{481} , w_{482} , w_{483} , w_{484} , w_{485} , w_{486} , w_{487} , w_{488} , w_{489} , w_{490} , w_{491} , w_{492} , w_{493} , w_{494} , w_{495} , w_{496} , w_{497} , w_{498} , w_{499} , w_{500} , w_{501} , w_{502} , w_{503} , w_{504} , w_{505} , w_{506} , w_{507} , w_{508} , w_{509} , w_{510} , w_{511} , w_{512} , w_{513} , w_{514} , w_{515} , w_{516} , w_{517} , w_{518} , w_{519} , w_{520} , w_{521} , w_{522} , w_{523} , w_{524} , w_{525} , w_{526} , w_{527} , w_{528} , w_{529} , w_{530} , w_{531} , w_{532} , w_{533} , w_{534} , w_{535} , w_{536} , w_{537} , w_{538} , w_{539} , w_{540} , w_{541} , w_{542} , w_{543} , w_{544} , w_{545} , w_{546} , w_{547} , w_{548} , w_{549} , w_{550} , w_{551} , w_{552} , w_{553} , w_{554} , w_{555} , w_{556} , w_{557} , w_{558} , w_{559} , w_{560} , w_{561} , w_{562} , w_{563} , w_{564} , w_{565} , w_{566} , w_{567} , w_{568} , w_{569} , w_{570} , w_{571} , w_{572} , w_{573} , w_{574} , w_{575} , w_{576} , w_{577} , w_{578} , w_{579} , w_{580} , w_{581} , w_{582} , w_{583} , w_{584} , w_{585} , w_{586} , w_{587} , w_{588} , w_{589} , w_{590} , w_{591} , w_{592} , w_{593} , w_{594} , w_{595} , w_{596} , w_{597} , w_{598} , w_{599} , w_{600} , w_{601} , w_{602} , w_{603} , w_{604} , w_{605} , w_{606} , w_{607} , w_{608} , w_{609} , w_{610} , w_{611} , w_{612} , w_{613} , w_{614} , w_{615} , w_{616} , w_{617} , w_{618} , w_{619} , w_{620} , w_{621} , w_{622} , w_{623} , w_{624} , w_{625} , w_{626} , w_{627} , w_{628} , w_{629} , w_{630} , w_{631} , w_{632} , w_{633} , w_{634} , w_{635} , w_{636} , w_{637} , w_{638} , w_{639} , w_{640} , w_{641} , w_{642} , w_{643} , w_{644} , w_{645} , w_{646} , w_{647} , w_{648} , w_{649} , w_{650} , w_{651} , w_{652} , w_{653} , w_{654} , w_{655} , w_{656} , w_{657} , w_{658} , w_{659} , w_{660} , w_{661} , w_{662} , w_{663} , w_{664} , w_{665} , w_{666} , w_{667} , w_{668} , w_{669} , w_{670} , w_{671} , w_{672} , w_{673} , w_{674} , w_{675} , w_{676} , w_{677} , w_{678} , w_{679} , w_{680} , w_{681} , w_{682} , w_{683} , w_{684} , w_{685} , w_{686} , w_{687} , w_{688} , w_{689} , w_{690} , w_{691} , w_{692} , w_{693} , w_{694} , w_{695} , w_{696} , w_{697} , w_{698} , w_{699} , w_{700} , w_{701} , w_{702} , w_{703} , w_{704} , w_{705} , w_{706} , w_{707} , w_{708} , w_{709} , w_{710} , w_{711} , w_{712} , w_{713} , w_{714} , w_{715} , w_{716} , w_{717} , w_{718} , w_{719} , w_{720} , w_{721} , w_{722} , w_{723} , w_{724} , w_{725} , w_{726} , w_{727} , w_{728} , w_{729} , w_{730} , w_{731} , w_{732} , w_{733} , w_{734} , w_{735} , w_{736} , w_{737} , w_{738} , w_{739} , w_{740} , w_{741} , w_{742} , w_{743} , w_{744} , w_{745} , w_{746} , w_{747} , w_{748} , w_{749} , w_{750} , w_{751} , w_{752} , w_{753} , w_{754} , w_{755} , w_{756} , w_{757} , w_{758} , w_{759} , w_{760} , w_{761} , w_{762} , w_{763} , w_{764} , w_{765} , w_{766} , w_{767} , w_{768} , w_{769} , w_{770} , w_{771} , w_{772} , w_{773} , w_{774} , w_{775} , w_{776} , w_{777} , w_{778} , w_{779} , w_{780} , w_{781} , w_{782} , w_{783} , w_{784} , w_{785} , w_{786} , w_{787} , w_{788} , w_{789} , w_{790} , w_{791} , w_{792} , w_{793} , w_{794} , w_{795} , w_{796} , w_{797} , w_{798} , w_{799} , w_{800} , w_{801} , w_{802} , w_{803} , w_{804} , w_{805} , w_{806} , w_{807} , w_{808} , w_{809} , w_{810} , w_{811} , w_{812} , w_{813} , w_{814} , w_{815} , w_{816} , w_{817} , w_{818} , w_{819} , w_{820} , w_{821} , w_{822} , w_{823} , w_{824} , w_{825} , w_{826} , w_{827} , w_{828} , w_{829} , w_{830} , w_{831} , w_{832} , w_{833} , w_{834} , w_{835} , w_{836} , w_{837} , w_{838} , w_{839} , w_{840} , w_{841} , w_{842} , w_{843} , w_{844} , w_{845} , w_{846} , w_{847} , w_{848} , w_{849} , w_{850} , w_{851} , w_{852} , w_{853} , w_{854} , w_{855} , w_{856} , w_{857} , w_{858} , w_{859} , w_{860} , w_{861} , w_{862} , w_{863} , w_{864} , w_{865} , w_{866} , w_{867} , w_{868} , w_{869} , w_{870} , w_{871} , w_{872} , w_{873} , w_{874} , w_{875} , w_{876} , w_{877} , w_{878} , w_{879} , w_{880} , w_{881} , w_{882} , w_{883} , w_{884} , w_{885} , w_{886} , w_{887} , w_{888} , w_{889} , w_{890} , w_{891} , w_{892} , w_{893} , w_{894} , w_{895} , w_{896} , w_{897} , w_{898} , w_{899} , w_{900} , w_{901} , w_{902} , w_{903} , w_{904} , w_{905} , w_{906} , w_{907} , w_{908} , w_{909} , w_{910} , w_{911} , w_{912} , w_{913} , w_{914} , w_{915} , w_{916} , w_{917} , w_{918} , w_{919} , w_{920} , w_{921} , w_{922} , w_{923} , w_{924} , w_{925} , w_{926} , w_{927} , w_{928} , w_{929} , w_{930} , w_{931} , w_{932} , w_{933} , w_{934} , w_{935} , w_{936} , w_{937} , w_{938} , w_{939} , w_{940} , w_{941} , w_{942} , w_{943} , w_{944} , w_{945} , w_{946} , w_{947} , w_{948} , w_{949} , w_{950} , w_{951} , w_{952} , w_{953} , w_{954} , w_{955} , w_{956} , w_{957} , w_{958} , w_{959} , w_{960} , w_{961} , w_{962} , w_{963} , w_{964} , w_{965} , w_{966} , w_{967} , w_{968} , w_{969} , w_{970} , w_{971} , w_{972} , w_{973} , w_{974} , w_{975} , w_{976} , w_{977} , w_{978} , w_{979} , w_{980} , w_{981} , w_{982} , w_{983} , w_{984} , w_{985} , w_{986} , w_{987} , w_{988} , w_{989} , w_{990} , w_{991} , w_{992} , w_{993} , w_{994} , w_{995} , w_{996} , w_{997} , w_{998} , w_{999} , w_{1000} , w_{1001} , w_{1002} , w_{1003} , w_{1004} , w_{1005} , w_{1006} , w_{1007} , w_{1008} , w_{1009} , w_{1010} , w_{1011} , w_{1012} , w_{1013} , w_{1014} , w_{1015} , w_{1016} , w_{1017} , w_{1018} , w_{1019} , w_{1020} , w_{1021} , w_{1022} , w_{1023} , w_{1024} , w_{1025} , w_{1026} , w_{1027} , w_{1028} , w_{1029} , w_{1030} , w_{1031} , w_{1032} , w_{1033} , w_{1034} , w_{1035} , w_{1036} , w_{1037} , w_{1038} , w_{1039} , w_{1040} , w_{1041} , w_{1042} , w_{1043} , w_{1044} , w_{1045} , w_{1046} , w_{1047} , w_{1048} , w_{1049} , w_{1050} , w_{1051} , w_{1052} , w_{1053} , w_{1054} , w_{1055} , w_{1056} , w_{1057} , w_{1058} , w_{1059} , w_{1060} , w_{1061} , w_{1062} , w_{1063} , w_{1064} , w_{1065} , w_{1066} , w_{1067} , w_{1068} , w_{1069} , w_{1070} , w_{1071} , w_{1072} , w_{1073} , w_{1074} , w_{1075} , w_{1076} , w_{1077} , w_{1078} , w_{1079} , w_{1080} , w_{1081} , w_{1082} , w_{1083} , w_{1084} , w_{1085} , w_{1086} , w_{1087} , w_{1088} , w_{1089} , w_{1090} , w_{1091} , w_{1092} , w_{1093} , w_{1094} , w_{1095} , w_{1096} , w_{1097} , w_{1098} , w_{1099} , w_{1100} , w_{1101} , w_{1102} , w_{1103} , w_{1104} , w_{1105} , w_{1106} , w_{1107} , w_{1108} , w_{1109} , $w_{$


chlore, ou un de ses sels.

13. Composé selon la revendication 1 de formule :




dans laquelle X et R sont tels que définis dans la revendication 1 et g₄ représente un atome de brome, un groupe méthyle ou trifluorométhyle ou un de ses sels.

14. Procédé pour la préparation des composés de formule (I) selon la revendication 1, caractérisé en ce que on traite un dérivé de l'acide 3-pyrazolecarboxylique de formule :




dans laquelle w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, g₂, g₃, g₄, g₅, g₆ et R₄ sont tels que définis pour (I) dans la revendication 1 ou une de ses formes activées, un de ses esters ou chlorures d'acides avec


, soit avec une amine de formule HNR₁R₂ dans laquelle R₁ et R₂ sont tels que définis pour (I) dans la revendication 1 pour obtenir les amides de formule :




dans laquelle w₂, w₃, w₄, w₅, w₆, g₂, g₃, g₄, g₅, g₆, R₄, R₁ et R₂ sont tels que définis pour (I),
 . soit éventuellement avec une amine primaire R₃NH₂ dans laquelle R₃ est tel que défini pour (I) dans la revendication 1 pour obtenir les amides intermédiaires (V) de formule :




15 dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_4$ et R_3 sont tels que définis pour (I) pour obtenir par réduction par un hydruire métallique les amines intermédiaires de formule :




30 dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_4$ et R_3 sont tels que définis pour (I), qui sont transformées en amide ou en urée de formule :




50 dans lesquelles $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6, R_2, R_3$ et R_4 sont tels que définis pour (I) par réaction avec respectivement un chlorure d'acide de formule $R_2\text{COCl}$ ou un isocyanate de formule $R_2\text{-N=C=O}$ dans lesquels R_2 est tel que défini pour (I), soit avec un dérivé de l'azidure de diphenylphosphoryle en milieu basique suivi d'un traitement acide en milieu alcoolique pour obtenir l'amine intermédiaire de formule :




dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I), qui est soumis à l'action d'un chlorure d'acide $R_2\text{COCl}$ ou d'un isocyanate $R_2\text{N}=\text{C}=\text{O}$ pour obtenir respectivement des amides et les urées de formule :



dans lesquelles $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I) et R_3 représente l'hydrogène, les mêmes composés pour lesquels R_3 est différent de l'hydrogène étant préparés à partir de l'amine primaire (VII) ci-dessus transformée en amine secondaire de formule :




dans laquelle $w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$ et R_4 sont tels que définis pour (I) et R'_3 représente un (C_1-C_2) alkyle, qui sont ensuite soumises à l'action d'un chlorure d'acide $R_2\text{COCl}$ ou d'un isocyanate $R_2\text{N}=\text{C}=\text{O}$ pour obtenir les amides et les urées de formule (Id) et (Ie) telles que définies ci-dessus dans lesquelles R_3 est différent de l'hydrogène, soit avec un réactif organomanganeux $R_3\text{MnX}_1$ dans lequel R_3 est tel que défini pour (I) dans la revendication 1 et X_1 représente un halogène pour obtenir les dérivés cétoniques de formule :



(If)

les composés ainsi obtenus sont ensuite éventuellement transformés en l'un de leurs sels.

15. Composés de formule :



dans laquelle R_4 est tel que défini dans la revendication 1 et Alk représente un (C_1-C_8) alkyle.

16. Composition pharmaceutique contenant, en tant que principe actif, un composé de formule (I) selon l'une des revendications 1 à 13.
17. Composition pharmaceutique selon la revendication 16, sous forme d'unité de dosage, dans laquelle le principe actif est mélangé à au moins un excipient pharmaceutique.
18. Composition selon la revendication 17 contenant de 2,5 à 1000 mg de principe actif.

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 93 40 1614

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 477 049 (ELF SANOFI) 25 Mars 1992 * le document en entier *	1,5,6	C07D231/14 C07D231/12 C07D231/40
A,D	EP-A-0 418 845 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO.) 27 Mars 1991 * revendications *	1,4,5	
A	EP-A-0 029 363 (MORISHITA PHARMACEUTICAL CO.) 27 Mai 1981	1,4,5	
A	EP-A-0 248 594 (ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION) 9 Décembre 1987 * le document en entier *	1,4,5	
A	JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY, PERKIN TRANSACTIONS 1. vol. 21, 1973, LETCHWORTH GB pages 2532 - 2535 G.V. BOYD ET AL. 'Ring Transformations of Morpholinofurans and N-(2,3-Dihydro-2-furilidene) morpholinium salts' * compound 16 *		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 31 AOUT 1993	Examinateur DE JONG B.S.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons * : membre de la même famille, document correspondant	

RPO FORM 1500 (3.9.92) (P/9001)